



dupl
G 2 584

Digitized by the Internet Archive
in 2013


О П Ы Т Ъ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
ВСѢХЪ ЖИВОТНЫХЪ
РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ,

ИЗДАННЫЙ

ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
ЗАСЛУЖЕННЫМЪ ПРОФЕССОРОМЪ, ДѢЙСТВИТЕЛЬ-
НЫМЪ СТАТСКИМЪ СОВѢТНИКОМЪ И КАВАЛЕРОМЪ

ИВАНОМЪ ДВИГУБСКИМЪ.

Съ изображеніями животныхъ.



МОСКВА.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.
1833.

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ шѣмъ, чшобы по оппечашаніи представлены были въ Ценсур-
ный Комишетъ шри экземиллара сей книги. Москва,
дня 1835 года.

*Ценсоръ, Профеесоръ, Коллежскій Советникъ и Кава-
леръ Иванъ Снегиревъ.*





О Т Ъ И З Д А Т Е Л Я .

Россійская Имперія , окруженная съ разныхъ сторонъ морями , имѣющая множество большой величины озеръ и орошаемая безчисленными рѣками и рѣчками , изобилуетъ чрезвычайнымъ множествомъ рыбъ , каковаго изобилія нѣтъ ни въ одномъ изъ Европейскихъ Государствъ .

Но всѣ ли рыбы Рускія извѣстны ? Менѣе чѣмъ другія животныя , а особливо рыбы морскія , которыхъ ловятъ только возлѣ береговъ , или на поверхности морей , глубина которыхъ недостижима .


Здѣсь предлагается обзорѣніе тѣхъ только породъ , которыя до сего времени болѣе или менѣе сдѣлались намъ извѣстны трудами неутомимыхъ естественныхъ изыскателей , грядущимъ поколѣніямъ которыхъ предоставляется пополнить свѣдѣнія ихъ предшественниковъ .

Что касается до порядка , въ которомъ изложены въ сей книжкѣ рыбы , то издатель долженъ былъ избрать расположеніе *Линнеево* , измѣненное нѣсколько *Форстеромъ* , какъ удобнѣйшее и легчайшее до сихъ поръ для частнаго изчисленія рыбъ какого нибудь Государства . Издатель охотно бы принялъ въ руководство новѣйшее расположеніе знаменитаго Ихтіолога *Кювье* , но сочиненіе его о

рыбахъ осталось не оконченнымъ, а припомъ
заключаетъ въ себѣ такія же затрудненія, какія
находятся и въ другихъ расположеніяхъ рыбъ;
нѣкоторые же роды рыбъ, Г-номъ Кювье опредѣ-
ленные, приняты въ предлагаемомъ опытѣ. Рисун-
ки, прилагаемые для объясненія родовъ Россій-
скихъ рыбъ, заимствованы большею частію изъ
извѣстнаго сочиненія *Блоха* о рыбахъ.

И. Д.

Р Ы Б Ы.



Р Ы Б Ы.

А) РЫБЫ ХРЯЩЕВАТО-ПЕРЫЯ.

(Pisces Chondropterygii).

У сихъ рыбъ скелетъ и плавательныя перья гибкія, хрящеватыя, т. е. состоятъ не изъ костяныхъ волоконъ, но изъ известковыхъ зернышекъ.

П О Р Я Д О К Ъ І.

Р. ХРЯЩЕВАТО-ПЕРЫЯ СЪ ЖАБРАМИ НЕПОДВИЖНЫМИ (P. Chondropterygii branchiis fixis).

У сихъ рыбъ жаберныхъ закрышекъ нѣтъ, и самыя жабры у нихъ срослись съ кожею, въ которой бываетъ по нѣскольку скважинъ для проходу воды.

Родъ І. Б Р Ю Х О Ж А Б Р И К Ъ (Gastrobranchus, Blochii.).

Ротъ круглый съ 3-ью усиками; на брюхѣ два отверстія, ведущія къ мѣшечатымъ жабрамъ; плавательныя перья: спинное, хвостовое и проходное срослись въ одно перо, а другихъ перьевъ нѣтъ (*).

І. Б. слѣпый (G. coecus, Bloch.; *Muxine glutinosa*, Linn.). Спина синевапая, бока красновашые, а брюхо бѣлое. Длина 9 дюймовъ. (Рисунокъ І).

(*) Брюхожабрикъ Линнеемъ описанъ въ числѣ червей, подъ именемъ *Muxine*; по внутреннему устройству онъ подходитъ къ Мипогамъ. Туловище его мягкое, клейкое; глаза лежатъ подъ кожею и снаружи невидны; на верхней часинѣ рта есть трубка для проходу воды. Рыбки сіи живутъ въ моряхъ и присакая ртомъ къ другимъ рыбамъ, сосутъ ихъ соки.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ.

Р. II. МИНОГА (*Petromizon, Lin.*)

Ротъ круглый; на каждой сторонѣ шеи по 7 *жаберныхъ отверстій*; *плавательныхъ перьевъ* ни грудныхъ, ни брюшныхъ, ни проходныхъ нѣтъ, а *спинныхъ два* (*).

2. *М. морская* (*P. marinus, Lin. P. Lampetra, Pall.; Die Lamprete; La Lamproie*). Конические зубы во рту лежатъ въ нѣсколько рядовъ; верхъ тѣла и бока желтоваты съ темными неправильными пятнами; исподъ сребристый. *Дл.* около 3 футовъ. (*Рис. 2 фиг. 1*).

Вод. во всѣхъ моряхъ, омывающихъ Россійскія владѣнія, хотя и не въ большомъ количествѣ; изъ морей заходитъ иногда и въ рѣки.

3. *М. Вьюнъ* (*P. fluviatilis, L.; Das gemeine Neunauge; Le Lamprillon.*). Зубы во рту лежатъ въ одинъ рядъ; зеленоватое или темное тѣло съ извилистыми поясками; спинныя перья ошнѣльные: *второе угловатое*. *Дл.* около 1 фута (*Рис. 2 фиг. 2*).

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ по всей Имперіи. Мясо вкусное и употребляется въ пищу какъ свѣжее, такъ и маринованное.

4. *М. Камчатская* (*P. Camtschaticus, Tilesii*). Мѣлкіе зубы въ овальномъ рту лежатъ въ одинъ рядъ; тѣло сверху темнооливковое безъ пятенъ и поясковъ; *второе спинное плавательное перо сливается съ хвостовымъ*. *Дл.* 7 дюйм.

(*) У *Минога* тѣло цилиндрическое, длинное, голое, клейкое; глаза у всѣхъ почти явственно примѣшныя; на верхней части головы есть опверсшіе для воды; жабры мѣшчатыя. Миноги ртомъ крѣпко присаюшъ къ камнямъ и другимъ тѣламъ. Однѣ породы живутъ въ соленыхъ, а другія въ прѣсныхъ водахъ; мясо ихъ вкусное, хотя и неудобоваримое; ѣдятъ его вареное, жареное и маринованное.

Вод. около Камчатки въ Петропавловскомъ портѣ.

5. *М. безглазая* (*P. lumbricalis*, *Pall.*). *Ротъ* маленькій, *усаженный* внутри весьма мѣлкими *шишечками*; *глаза снаружи непримѣтны*; *шѣло* сверху темное съ поясками; второе продолговатое спинное перо срослося съ хвостовымъ.

Вод. въ рѣкѣ Енисей и въ рѣкахъ и рѣчкахъ Камчатскихъ.

6. *М. Планерова* (*P. Planeri*, *Bloch.*). *Во рту* острые *шишечки* и за ними рядъ мѣлкихъ зубовъ; *шѣло* кольчатое, цвѣту оливковаго; *второе спинное перо*, сливающееся съ хвостовымъ, *угластое*. *Дл.* 6 — 7 дюймовъ.

Вод. по рѣкамъ въ Финляндіи. *Fauna Fennica*, *Aut. Sadelino et Alcenio. Авог.* 8. 1819.

7. *М. жаберная* (*P. branchialis*, *L.*). *Ротъ безъ* зубовъ и внизу раздѣленъ на двѣ лопасти; *шѣло* кольчатое, сверху зеленоватое, на бокахъ желтоватое, а снизу бѣлое; *второе спинное перо* длинное, узенькое. *Дл.* отъ 6 до 10 дюймовъ.

Вод. въ Финляндіи, въ рѣкахъ и рѣчкахъ, имеющихъ песчаное дно. *Fauna Fennica.*

Р. III. А К К У Л А (*Squalus*, *L.*).

Ротъ на нижней части головы; *жаберныхъ отверстій съ обѣихъ сторонъ шеи по 5*; *глаза по бокамъ головы*; *шѣло* длинное, цилиндрическое (*).

(*) У *Аккулъ* рыло не одинаковое: у нѣкоторыхъ породъ тупое, а у другихъ острое, но ротъ у всѣхъ снабженъ множествомъ острыхъ зубовъ; плавающие перья шестыя, и распорки у нихъ едва примѣтны. Кожа на шѣлѣ у всѣхъ почти жесткая. Это хищныя морскія рыбы.

8. *А. пестрая* (*S. canicula*, *L.*; Der getiegerte Hay; La Roussette tigrée). Рыло тупое, туловище красноватое со множественномъ мелкихъ темныхъ глазковыхъ пятенъ. Дл. около 4 ф.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ. Спинныхъ плавательныхъ перьевъ два.

9. *А. Мокой* (*S. Carcharias*, *L.*; Der grosse Hay-Fisch; Le grand Requin). Цвѣтомъ пепельная; спинное плавательное перо одно; зубы во рту трех-угольные, съ зазубренными боками. Дл. отъ 16 до 30 футовъ.

Вод. въ Восточномъ океанѣ, около Камчатки.

10. *А. колючая* (*S. Spinax*, *L.*). Туловище сверху темное, а снизу черноватое; предъ спинными плавательными перьями по колючкѣ, а близъ порожницы вовсе нѣтъ никакого пера. Дл. около 3 футовъ.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Бѣломъ морѣ.

11. *А. синяя* (*S. glaucus*, *L.*; Der blaue Hay; Le Cagnot bleu). Рыло острое, туловище цвѣтомъ сверху синеватое, а снизу бѣловатое; бока у хвоста гладкіе. Дл. отъ $2\frac{1}{2}$ до 7 ф. (Рис. 5).

Вод. въ Балтійскомъ морѣ.

Р. IV. РАШПЛЯ (*Squatina*, *Dumeril*).

Отличается отъ Аккулъ ршомъ, не внизу головы находящимся, но на концѣ рыла, и глазами, которые лежатъ на верху головы, а не по бокамъ. Грудные плавательные перья очень широкія; шло плоское (*).

(*) Рашпля Линнеемъ и другими писателями причисляется къ Аккуламъ; но она кромѣ означенныхъ признаковъ отличается и шломъ, что у ней нѣтъ заднепроходнаго плавательнаго пера, а на головѣ есть дыхательныя опверсія. Голова круглая; жаберныя опверсія на шеѣ выше грудныхъ плавательныхъ перьевъ. Рашпли живутъ въ моряхъ.

12. *P. гладкая* (*S. laevis*, *Cuvier*; *Squalus squatina*, *L.*; *Der Meerengel*; *L'Ange*). Цѣшу сѣраго. Дл. 4 — 8 ф. (*Рис. 4*).

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Бѣломъ морѣ.

Р. V. С К А Т Ъ (*Raia*, *L.*).

Ротъ на исподней часпи головы, поперечный и снабженный множесвомъ зубовъ; *жаберныя отверстія* на исподней сторонѣ груди, съ обоихъ боковъ по 5. Тѣло плоское, круговидное или ромбоидальное (*).

13. *С. щитковый* (*R. clavata*, *L.*; *Der Nagelroche*; *La Raie bouclée*). Сверху вся усѣяна кривыми колючками; *отъ головы вдоль спины и хвоста идетъ рядъ колючекъ*, а *хвостъ и по бокамъ или усажень*. Туловище сверху темнаго цвѣшу съ черными и бѣлыми пятнами. Дл. 2 — 12 фуш.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Бѣломъ морѣ. Мясо его хоня и жестко, но вкусно.

14. *С. Морская Камбала* (*R. Batis*, *L.*; *Der glatte Roche*; *La Raie lisse*); гладкая, сверху темно-сѣрая, а снизу бѣлая съ черными пятнами; *хвостъ сверху усажень колючками въ одинъ рядъ*. Дл. отъ 2 до 12 ф.

Вод. около Камчатки и оспрововъ Курильскихъ. Мясо вкусное.

15. *С. Черноморскій* (*R. Pontica*, *Pall.*). Зубы у него зернистые; туловище ромбоидальное, чрезвычайно шероховатое, усажено кривыми колючками; *колючки вдоль спины идуть въ одинъ рядъ*, а *на хвостъ въ три ряда*.

(*) *Скаты* (отъ Англійскаго Skate) суть морскія рыбы, плоскія, съ маленькою оспрою головою, отъ которой идуть широкія грудныя плавающие перья мясепныя, проспирающіяся до брюшныхъ перьевъ; хвостъ больше или меньше длинный, шокій, съ двумя при кощѣ плавающимъ перьями; проходнаго пера нѣтъ. Это хищныя рыбы.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крымскихъ береговъ. Весьма похожъ на *С. щитковаго*. Сверху темно-сѣрый съ черными черточками, а съисподи бѣлый. Мясо его не очень вкусное. *Палласъ*.

16. *С. Шагъ* (*R. fullonica? L.*). Зубы острые, спина колючая; подлѣ глазъ находящіяся *коложки* въ одинъ рядъ, а на хвостъ съ два ряда.

Вод. около Камчатки и оспрововъ Курильскихъ. *Палласъ*.

17. *С. Морской котъ* (*R. Pastinaca, L.; Der Stechroche; Le Pastenaque*). На спинѣ, брюхѣ и хвостѣ нѣтъ плаванельныхъ перьевъ; на половинѣ хвоста большая зазубренная *коложка*. Цвѣтъ сверху темный, съисподи бѣловатый. Дл. 1 ф. и болѣе. (*Рис. 5*).

Вод. въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ.

ПРИМѢЧ. *Палласъ* въ своей Зоографіи, Том. III. стр. 61, помѣстивъ подъ названіемъ *Raia mucosa* рыбу, описанную *Стеллеромъ*, который видѣлъ ее выброшенную изъ моря на Камчатскомъ мысу. Описанная *Стеллеромъ* рыба не имѣетъ ни зубовъ, ни костей, ни плаванельныхъ перьевъ, а состоитъ вся изъ безобразной слизистой массы, будучи только плоска и имѣя фигуру Камбалы, ротъ на нижней части головы, и на бокахъ по пяти опверстій, и длинный хвостъ: въ шепереннее время шрудно причисливъ ее къ роду *Ската*, а вѣроятно она составивъ особый родъ, когда будетъ описана надлежащимъ образомъ.

Р. VI. ХИМЕРА (*Chimaera, L.*).

Голова оканчивается коническимъ рыломъ; ротъ маленький, въ кошоромъ вмѣсто зубовъ голыя челюсти съ зазубринами; на каждой сторонѣ шеи по одному жаберному отсерстію; второе

спинное плавающее перо начинаясь пошчасъ подлѣ перваго, продолжается до конца хвоста (*).

18. *X. странная* (Ch. monstrosa, L.; Die Seeratte; La Chimère); серебристаго цвѣту, съ темными плавниками; хвостъ оканчивается тонкою нитью. Дл. 2—3 ф. (Рис. 6).

Вод. въ Сѣверномъ и Восточномъ океанѣ.

П О Р Я Д О К Ъ II.

Р. ХРЯЩЕВАТО-ПЕРЫЯ СЪ ЖАБРАМИ ПОДВИЖНЫМИ (Р. Chondropterygii branchiis liberis).

У сихъ рыбъ жаберное отверстіе очень широкое съ крышечкою, но жаберная перепонка безъ костяныхъ распорокъ.

Р. VII. О С Е Т Р Ъ (Acipenser, L.)

Голова съ острѣмъ рыломъ; ротъ маленькій, на исподней сторонѣ рыла, безъ зубовъ, выпускной: передъ нимъ находящаяся 4 усика. Жаберныя отверстія по бокамъ; туловище длинное, съ косматыми жучками (щипками), идущими вдоль шѣла въ нѣсколько рядовъ (**).

(*) *Химеры*, рыбы морскія, имѣютъ туловище кругловатое, длинное и голое. Жаберныя дуги у нихъ похожи на шавковыя же костистыхъ рыбъ, съ шѣмъ только опланиемъ, что послѣдняя дуга сросшаяся у нихъ съ кожей. Первое спинное плавающее перо, лежащее прямо подъ грудными перьями, имѣетъ большую колючку.

(**) *Осетры* принадлежатъ къ большимъ морскимъ рыбамъ, копорыя весною въ великомъ числѣ заходятъ въ рѣки для мстанія икры. Въ Россіи они находящаяся въ чрезвычайномъ множествѣ, въ моряхъ: Черномъ, Азовскомъ и Каспійскомъ, въ меньшемъ количествѣ въ Сѣверномъ океанѣ и еще въ меньшемъ въ моряхъ Балтійскомъ и Бѣломъ. Голова у *Осетровъ* покрыта сверху и по бокамъ шведыми и широкими косматыми щипками, плавающими брюшными

19. *О. обыкновенный* (A. Sturio, L.; Der Stöhr; L'Esturgeon). Рыло короткое тупое; ротъ уже головы, губы мясисныя; шло усажено вдоль пятью рядами костяныхъ большихъ жесткихъ жучковъ. Дл. отъ 5 до 6 фузовъ, или около 3 аршинъ. (Рис. 7).

Вод. въ Черномъ, Азовскомъ и Каспійскомъ моряхъ, откуда заходитъ въ Донъ, Волгу, Уралъ, а изъ Сѣвернаго океана въ Енисей, Иртышъ, Каму и пр. Цѣль на спинѣ сѣро-синевашый, а на бокахъ и брюхѣ бѣлый. Мясо его очень вкусно, также икра, везига; изъ воздушнаго пузыря достается рыбій клей. Молоденькіе осетры, покрытые весьма острыми жучками и худощавые, называются *Костерками* и *Костерою*. Осетры Камскіе, Енисейскіе, Рымникскіе и Волжскіе вкуснѣе другихъ.

20. *О. Осетровый шипъ* (A. Schipa, Lin-Gmel.). Отличается отъ обыкновеннаго осетра, (котораго можетъ быть онъ есть и выродокъ) тѣмъ, что голова у него плосче, *рыло длиннѣе* и усы на равномъ почти разстояніи какъ отъ конца рыла, такъ и отъ рта; жаберныя покрышки плоскія и не вздушныя; брюшныя жучки осирѣе, нежели у осетра. Дл. отъ 2 до 3 арш.

Вод. особенно въ Каспійскомъ морѣ, изъ коего заходитъ въ Волгу, также въ Байкаль и пр.

21. *О. Блуга* (A. Huso, L.; Der Hausen, Le grand Esturgeon). Рыло острое коническое, усики при концахъ шире, ротъ поперечно полулунный, шириною съ голову, губы цѣльныя; шуловище не очень шероховатое: жучки, по величинѣ

перьевъ два, спинное одно. Нѣкоторыя породы сего рода достигаютъ значительной величины. Они составляютъ важную отрасль торговли, и полезны своимъ мясомъ, икрой, везигой и такъ называемымъ рыбьимъ клеемъ, доставаемымъ изъ ихъ воздушныхъ пузырей.

пѣла не большіе. *Дл.* отъ сажени до 2 саженой и болѣе.

Вод. въ Черномъ и Каспійскомъ моряхъ, откуда заходишь въ Донъ, Волгу и пр. Изъ бѣлужьихъ спиннокъ приготавливаются *балики*; мясо ея и икра хуже осетровой; въ почкахъ ихъ находятъ бѣлужій камень. Цѣпь бѣлугъ сверху синевато-сѣрый, а бока и брюхо бѣлыя.

22. *О. бѣлужій шипъ* (*A. nudiventris, Lovetski*). Опличается отъ бѣлуги *рыломъ плоскимъ, прямымъ*, и которое короче и шупѣ бѣлужьяго, *ртомъ поперечнымъ, ширину головы не превышающимъ, жучками* идущими вдоль, не въ пять рядовъ, но въ три ряда, ибо ихъ на брюхѣ вовсе нѣтъ. *Длиною* онъ менѣе бѣлуги.

Вод. преимущественно въ рѣкахъ Сибирскихъ. Цѣпшомъ сверху сѣро-синевашый, а съисподи бѣлый.

23. *О. Севрюга* (*A. Stellatus, L.; A. Helops, Pall.*). Рыло длинное, *полуцилиндрическое, въ шесть разъ длиннѣе поперечнаго діаметра рта*; шло очень жесткое съ пятью рядами закривленныхъ *острыхъ жучковъ*. *Дл.* въ 1 арш. и болѣе.

Вод. въ моряхъ Черномъ, Азовскомъ и Каспійскомъ, откуда заходишь въ Донъ, Днѣпръ, Волгу и пр. Цѣпь сверху темный, а по бокамъ бѣлесованный. Севрюги, ловимыя въ Днѣпрѣ, извѣстны у шамошнихъ жишелей подъ именемъ *Пеструхъ*.

24. *О. Стерлядь* (*A. Ruthenus, L.; A. pygmaeus, Pall.; Der Sterlet; Le Sterlet*). Рыло коническое *острое, длиннѣе поперечнаго діаметра рта въ два раза*; шуловище очень шероховатое съ пятью рядами *острыхъ жучковъ*, идущихъ вдоль шла. *Дл.* отъ $\frac{3}{4}$ аршина до аршина и болѣе.

Вод. въ моряхъ: Черномъ, Азовскомъ, Каспійскомъ и въ Сѣверномъ океанѣ, откуда заходишь не только во всѣ рѣки въ нихъ впадающія, но и

въ меньшія, имѣющія сообщеніе съ первыми. Самыя большія сперяди въ рѣкѣ *Томь*, а самыя вкусныя въ *Камѣ* и *Енисей*. Цвѣтъ сверху темно-сѣрый, съ боковъ пепельный, а съисподи бѣлый.

25. *О. Калуга* (*A. Orientalis, Pall.*). Рыло длинное, острое, полуцилиндрическое; туловище не очень жесткое; *жузки* идутъ вдоль шѣла въ 5 рядовъ, *очень маленькіе*. Дл. около 6 фушовъ.

Вод. въ Восточномъ океанѣ, откуда заходитъ въ *Амуръ*, *Шилку* и *Аргунь*. Цвѣтъ сверху сѣроватый, а брюхо гладкое, бѣлое.

Р. VIII. ИГЛИКЪ (*Syngnathus, L.*).

Голова оканчивается длиннымъ трубчатымъ рыломъ, на концѣ котораго находишься ротъ. *Жабры* состоятъ изъ кисточекъ опдѣльно лежащихъ, а не гребенчатыхъ, какъ у всѣхъ другихъ рыбъ (*).

26. *И. Морской коніокъ* (*S. Hippocampus, L.; Das Meerpferdchen; Le Cheval marine*). Туловище нѣсколько сжатое, *семиугольное*, съ выпуклинами на спинѣ; *хвостъ* *четыреугольный* безъ плавательнаго пера. Дл. отъ 8 до 12.

Распорокъ съ плават. перьяхъ Грудн. 17, Спинн. 20, Проходн. 4.

Вод. въ Черномъ морѣ и Восточномъ Океанѣ.

27. *И. Черноморскій* (*S. Ponticus, Pall.*). Туловище *семиугольное*, спинные углы очень острые; хвостъ при корнѣ 6-угольный, а къ концу 4-угольный; плава-

(*) Туловище у *Пеликовъ* длинное, тонкое, угласное, покрытое колючими шипками. Они живутъ въ моряхъ. Дѣши ихъ выводятся въ особенномъ мѣшечкѣ, образуемомъ въ промежуткахъ опсавшей отъ шѣла кожи подъ брюхомъ или близъ хвоста.

пельныя перья грудныя, спинное и хвостовое лучисшыя, а проходное очень маленькое. *Дл.* около 12 дюймовъ.

Вод. въ Черномъ и Азовскомъ, а также и въ Каспійскомъ моряхъ, между водорослями.

28. *И. пестрый* (*S. variegatus*, *Pall.*). *Туловище* семиугольное пестрое, спинные углы очень острые, а боковые складчатые и близъ начала спиннаго плаващельнаго пера прерывающіеся, а потомъ опять продолжающіеся; плаващельныя перья: грудныя, спинное и хвостовое, лучисшыя.

Вод. въ Черномъ морѣ у Крымскихъ береговъ.

29. *И. серебристый* (*S. argentatus*, *Pall.*). *Туловище* почти шестиугольное, по причинѣ непримѣннаго брюшнаго угла; плаващельныя перья: грудныя, спинное и хвостовое, лучисшыя. *Дл.* 8 дюйм.

Вод. въ Черномъ морѣ. Исполъ пѣла серебришый.

30. *И. синеперый* (*S. Typhle*, *L.*; *Die Meernadel*; *L'Aiguille de mer*;) *туловище* шестиугольное, хвостъ 4-угольный; плаващельныя перья синевашыя. *Дл.* около 12 дюйм. (*Рис. 8, фиг. 1*).

Распорокъ у плав. пер. Гр. 13. С. 18. Пр. 5. Х. 10. (*).

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и Сѣверномъ Океанѣ.

31. *И. Игла рыба* (*S. Acus*, *L.*; *Die Trompete*; *La Trompète*.) На семиугольномъ туловищѣ щипковъ 20, а на шестиугольномъ хвостѣ 45. *Дл.* отъ 2 до 3 фузовъ (*Рис. 8 фиг. 2*).

С. 36. Г. 14. П. о. Б. о. Х. 10.

(*) Число распорокъ въ плаващельныхъ перьяхъ для краткости начинается первыми только большими буквами: С. значить спинныя перья, Г. грудныя, Б. брюшныя, П. проходныя и Х. хвостовыя.

Вод. въ Балпійскомъ морѣ; онъ испещренъ пияшнами и поясками темными и желтоватыми попеременно.

32. *И. безперый* (*S. aequoreus*, *L.*). Туловище 6-угольное, безъ плавательныхъ перьевъ грудныхъ и проходныхъ. Дл. около 4 дюйм.

Вод. въ Черномъ морѣ.

33. *И. змѣйчатый* (*S. Ophidion*, *L.*). Туловище круглое, зеленоватое; плавательныя перья на одной только спинѣ, а прочихъ нѣтъ. Дл. около $1\frac{1}{4}$ ф.

Вод. въ Балпійскомъ морѣ. *Fauna Fennica.*

34. *И. круглохвостый* (*S. pelagicus*, *L.*). Туловище 7-угольное; коричневаго цвѣту съ темными поясками. Дл. около 4 дюймовъ.

С. 16. Г. 14. П. 4. Х. 7.

Вод. по свидѣтельству *Ейхвальда*, *Шнейдера* и *Георги* въ Каспійскомъ морѣ; хотя опеченство его есть Южный океанъ, по свидѣтельству другихъ.

Р. IX. ПИНАТОРЪ (*Cyclopterus*, *L.*).

Плавательныя брюшныя перья, сросшіяся въ кружокъ, составляютъ отличительный признакъ сего рода, у котораго жаберная перепонка имѣетъ 6 распорокъ (*).

35. *П. угластый* (*C. Lumpus*, *L.*; *Der Seehase*; *Le Lievre de mer*). Острые костяные щипки лежатъ вдоль тѣла 7-ю рядами; спинныхъ перьевъ два. Дл. около 2 ф. (*Рис. 9*).

(*) *Пинагори* суть рыбы морекія, у которыхъ соединенныя въ кружокъ брюшныя перья служатъ имъ для приспаванія къ камнямъ. Ротъ у нихъ широкой съ зубами, кожа безъ чешуи, но иногда покрыва жучками или колючками. Туловище продолговато-горбаное.

С. 10. Г. 20. Б. 6. П. 12. X. 12.

Вод. въ Балтійскомъ, Бѣломъ и Ледовитомъ моряхъ. Спина темная, бока сѣрые, а брюхо оранжевое.

36. *П. Стеллеровъ* (C. Stelleri, Pall.). Туловище гладкое, и только на спинѣ передъ спиннымъ плавательнымъ перомъ находишься рядъ костяныхъ жушковъ. Дл. около 6 д.

Вод. около Камчатки въ Пепропавловской гавани. Туловище черноватое.

37. *П. брюшистый* (C. ventricosus, Pall.). Туловище овальное, голое, гладкое, брюшистое съ двудольнымъ мочевымъ пузыремъ. Дл. около 1 ф.

С. 10. Г. 18—20. Б. 6. П. 8—9. X. 10.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Камчатки; цвѣту темно-оливковаго.

38. *П. Морской ушканъ* (C. gelatinosus, Pall.). Туловище мягкое, продолговатое, голое; плавательныя грудныя перья чрезвычайно широкія; порошокъ на глоткѣ. Дл. около $1\frac{1}{2}$ фута.

С. 51. Г. 30. Б. 0. П. 45. X. 6.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Камчатки и въ его заливахъ. Увѣряюсъ также, что онъ водился въ Бѣломъ морѣ и Сѣверномъ океанѣ. Туловище бѣло-розовое.

39. *П. Канаисъ* (C. Calliodon, Pall.). Туловище продолговатое, сжатое, голова большая плоская: кончики зубовъ трилопастные. Дл. около 8 д.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Камчатки и близъ лежащихъ острововъ. Спина темно-желтая.

40. *П. полосатый* (C. Liparis, L.; C. lineatus, Gereshin). Туловище голое; плавательныя перья спинное и проходное соединяются съ хвостовымъ въ одно. Длин. около 12 д.

С. 41. Г. 54. Б. 6. П. 53. X. 10.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Бѣломъ морѣ. Темнаго цвѣту съ бѣловатыми полосками.

Р. Х. Л Я Г В А (*Lophius, L.*).

Грудныя плавательныя перья сидятъ на длинныхъ костяхъ плавъ, похожихъ на руки и перепнутыхъ наподобіе локтя; брюшныя перья на глоткѣ; жаберное отверстіе позади грудныхъ перьевъ (*).

41. Л. обыкновенная (*L. piscatorius, L.*; *Der Seeteufel; La Baudroie commun*). Сверху темная, а снизу бѣлая. Дл. около 6 фузовъ. (*Рис.* 10).

С. 51. Г. 24. Б. 5. П. 13. X. 8.

Попадается изрѣдка въ Балтійскомъ морѣ. *Faun. Fenn.*

Б). РЫБЫ КОСТИСТЫЯ (*P. Ossei*).

У сихъ рыбъ скелетъ больше или меньше твердый и костистый, а не хрящеватый.

П О Р Я Д О К Ъ III.

Р. ГОЛОБРЮХІЯ (*P. Apodes*).

У сихъ рыбъ нѣтъ вовсе на брюхѣ плавательныхъ перьевъ.

* Р. Г. м я г к о п е р ы я.

(*) У сихъ страннаго виду рыбъ голова гораздо шире тѣла, плоская какъ и все туловище; ротъ на концѣ рыла широкій, усаженный многешесвомъ зубовъ; голова и все тѣло усажено усиками; чешуй на тѣлѣ нѣтъ. Рыбы сии живутъ въ моряхъ.

Р. XI. УГОРЬ (*Muraena, L.*).

Гуловище длинное, цилиндрическое, покрытое слизью. *Жаберныя крышечки* лежатъ близь грудныхъ перьевъ, а опверспія ихъ очень узкія. *Ноздри* прубчатыя на концѣ рыла (*).

42. *У. обыкновенный* (*Al. Anguilla, L.; Der gemeine Aal; L'Anguille*). *Нижняя челюсть* длиннѣе верхней; спина зеленоватая, а брюхо бѣловатое. *Дл.* около 3 фузовъ и болѣе. (*Рис. 11*).

С. П. и Х. вмѣстѣ 1100. Г. 19.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и въ рѣкахъ, въ него впадающихъ; спина черноватая или зеленая, а исподъ шѣла желтоватый или сребристый.

45. *У синеватый* (*M. Conger, L.; Le Congre*). Спинное перо начинается у грудныхъ перьевъ и соединяется съ хвостовымъ и проходнымъ перьями, боковой рубецъ бѣлый, изъ почекъ составленный. *Дл.* около 5 фузовъ.

С. П. и Х. вмѣстѣ 306. Г. 19.

Вод. въ Восточномъ океанѣ и Черномъ морѣ. Спина синевато-темная, а брюхо бѣловатое.

Р. XII. ЗУБАТКА (*Anarhichas, L.*).

Голова толстая, тупая; пасть широкая; *зубовъ* во рту множество крѣпкихъ, костяныхъ: нижніе коренные и небные кругловатые, а передніе (6) коническіе, острые. *Спинное перо* во всю почти длину спины (**).

(*) *Угри* живутъ и въ моряхъ и въ рѣкахъ. Голова у нихъ острая, въ жаберной перепонкѣ 10 распорокъ, гуловище покрыто слизью и едва примѣтными маленькими чешуйками. Плавающие перья непарныя очень длинны. Мясо вкусное.

(**) *Зубатки* принадлежатъ къ числу самыхъ хищныхъ морскихъ рыбъ; гуловище у нихъ кругловатое гладкое, покрытое слизью. Въ жаберной перепонкѣ 6 распорокъ.

44. *З. пестрая* (*A. pantherinus*, *Zuiew.*). *Желто-бѣлая* съ кругловатыми темными пятнами. *Дл.* около 3 фузовъ.

С. 67. *Г.* 20. *Б. о. П.* 44. *Х.* 20.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ. *Лепехинъ*. Ее называютъ и *Сукою* рыбою.

45. *З. Капѣла* (*A. orientalis*; *Pall.*); *темнокоричневая*; губы толстыя, мясистыя съ наростами. *Дл.* 2 фуза.

С. 84. *Г.* 21. *Б. о. П.* 54. *Х.* 17.

Вод. въ Восточномъ морѣ около Камчатки и называется также *Сукою* рыбою.

46. *З. кусачка* (*A. Lupus*, *L.*; *Der Seewolf*; *Le Loup marin*); *темноспрая*, а брюхо бѣловатое. *Дл.* 14 ф. и болѣе. (*Рис.* 12).

С. 73 — 74. *Г.* 20. *Б. о. П.* 45 — 46. *Х.* 16 — 18.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и Сѣверномъ океанѣ.

Р. XIII. ПЕСКОРОЙ (*Ammodytes*, *L.*).

Голова уже пѣла, съ острыми рыломъ; *нижняя челюсть* длиннѣе верхней; *туловище* продолговатое тонкое; *спинное и проходныя перья* очень длинныя (*).

47. *П. сьроватый* (*A. Tobianus*, *L.*; *A. hexapterus*, *Pall.* *Der Sandaal*; *Le Lancon.*). На обоихъ бокахъ пѣла по два боковыхъ рубца. *Дл.* около 7 дюймовъ. (*Рис.* 13.)

С. 60. *Г.* 12. *Б. о. П.* 28. *Х.* 16.

(*) *Пескорой* суть морскія рыбки съ мѣлкими чешуйками. У нихъ спинное и проходное перья очень длинныя, но съ хвостовымъ вѣлчатымъ не соединяюща. Жаберная перепонка о 7 распоркахъ.

Вод. въ моряхъ: Балтійскомъ, Бѣломъ, Ледовитомъ и Восточномъ. Спина сѣровапосиневапая, бока сребристые.

48. *П. бѣловатый* (*A. septipinnis*, *Pall.*). На обоихъ бокахъ по одному боковому рубцу. Дл. около 6 дюймовъ.

С. 43. Г. 16. Б. 8. П. 24. Х. 14.

Вод. въ Восточномъ океанѣ. *Меркѣ*. Туловище бѣлое съ темными поясками. У него есть брюшные перья, почему принадлежишь ли онъ къ сему роду?

* * Р. Г. к о л ю з е п е р ы л.

XIV. О Ш И Б Е Н Ъ (*Orhidium*, *L.*).

Жаберныя закрышки большія: *жаберная перепонка* очень коротка и о 4 — 7 распоркахъ; *спинное и проходное перья* срослись съ *хвостовымъ* (*).

49. *О. бородастый* (*O. barbatum*, *L.*; *Der Schlangenfisch*, *La Donzelle*); *синевапосеребристый*; подъ горломъ 4 усика. Дл. около 6 д. (*Рис.* 14).

С. вмѣстѣ съ Пр. и Хв. 150. Г. 17 — 20. Б. о.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

50. *О. оцковый* (*O. ocellatum*, *Tilesii*; *Blennius*, *Pall.*); *желто-сѣрный* съ пурпуровыми поясками; на спинномъ перѣ 6 очковыхъ пятавъ (черныхъ съ бѣлымъ ободкомъ). Дл. 5 — 6 дюймовъ.

С. вмѣстѣ съ Пр. и Хв. 156. Г. 16. Б. о.

(*) *Ошибни* суть небольшія морскія рыбки, покрытыя чрезвычайно мѣлкими, почти непримѣнными чешуйками. Голова у нихъ маленькая, туловище продолговатое и сжатое, почему и называютъ его мечеобразнымъ. Мясо вкусное.

Вод. въ Пепропавловской Камчатской Гавани
Тилезій (*).

Р. XV. ГОЛОМЯНКА (*Elaeorhous*, *Pall.*).

Голова большая; *жаберныя* перепонки о 6 распоркахъ; *грудныя перья* очень длинныя; на спинѣ два пера (**).

51. *Г. Байкальская* (*E. Baicalensis*, *Pall.*; *Callyonimus Baicalensis*, *Pall.*). Цвѣтомъ желтоватая. Дл. около 7 дюймовъ. (*Рис.* 15).

С. $\frac{8}{28}$. Г. 13. Б. О. П. 32 X. 13.

Вод. единственно въ Байкалѣ, на днѣ его, и только мертва въ время бури выбрасывается на берега. Изъ мягкаго и жирнаго ея мяса вытапливается масло, продаваемое Кипайцамъ.

П О Р Я Д О К Ъ IV.

Р. К. ГОРЛОПЕРЫЯ (*P. Jugulares*).

У сихъ рыбъ брюшныя плавательныя перья лежатъ передъ перьями грудными.

* Р. Г. м л е к о п е р ы я.

(*) *Палласъ* и *Кювѣ* почитаютъ сію рыбку порокою *Слизняка* (*Blennius*); но у сей рыбки и слѣда нѣтъ брюшныхъ перьевъ, составляющихъ отличительный признакъ Слизняковъ; почему приличнѣе оставить ее въ семъ родѣ, пока дальнѣйшее изслѣдованіе сей рѣдкой рыбки опредѣлитъ ей настоящее мѣсто въ порядкѣ рыбъ.

(**) Г. *Палласъ* первый описалъ сію удивительную рыбу, нигдѣ еще не найденную кромѣ озера Байкала, и причислилъ ее къ роду *Callyonimus*; но разсмотрѣвши въ послѣдствіи времени внимательнѣе ея устройство, отдѣлилъ ее отъ сказаннаго рода, и составилъ особенный, подъ именемъ *Elaeorhous*. И дѣйствительно кромѣ вышеписанныхъ признаковъ, она отличается отъ *Красуновъ* (*Callyonimus*) шлѣомъ чрезвычайно мягкимъ, мясистымъ, непокрытымъ чешуями, большею частью и хвостомъ раздвоеннымъ. Выброшенная бурей на берегъ, скоро поршился, и не только людьми, но даже чайками и воронами не употребляется въ пищу.

Р. XVI. ТРЕСКА (*Gadus*, L.).

Голова гладкая: жаберная перепонка о 6—7 круглых распорках; спинных перьевъ большую частію по три, а проходныхъ по одному и по два: брюшныя не широкія и суживаются въ остріе (*).

(*) Спинныхъ перьевъ по три.

52. Т. обыкновенная (*G. Morhua*, L.; *Der Kabeliau*; *La Morue*). Желтоватая съ темными пятнами, даже и на верхнихъ плавательныхъ перьяхъ; на нижней челюсти одинъ усикъ; хвостъ цѣльный. Дл. 2—3 ф. (Рис. 16).

С. 15—21. Г. 16. Б. 6. П. 16—17. Х. 50.

Вод. въ Сѣверномъ и Восточномъ океанахъ. Боковой рубецъ прямъ и безъ пятенъ.

53. Т. пестрая (*G. Callarias*, L.; *Der Dorsch*; *La Dorse*). Тѣло пестрое; на нижней челюсти, которая гораздо короче верхней, усикъ одинъ; хвостъ цѣльный; боковой рубецъ широкій и состоящій изъ пятенъ. Длин. 2—3 ф.

С. 14—18. Г. 17. Б. 6. П. 17—18. Х. 16.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ. Весьма похожа на обыкновенную треску цѣломъ, но на плавательныхъ перьяхъ у ней вовсе нѣтъ пятенъ.

54. Т. Вахня (*G. Wachnia*, *Pall.*). На нижней челюсти усикъ одинъ, верхняя челюсть длиннѣе нижней; хвостъ цѣльный; туловище желтоватое безъ пятенъ. Дл. около 12 д.

(*) У Трески пасть большая; на нижней челюсти у многихъ одинъ или нѣсколько усиковъ; во рту зубы мѣлкіе. Туловище продолговатое съ мѣлкими чешуями, легко спадывающими; плавательныя перья мягки и покрыты кожей. Породы сего рода живутъ въ моряхъ и употребляются въ пищу.

Сп. 13 — 14. II-ое 16 — 19. III-ье 19 — 21. Г.
9. Б. 6. Пр. $\frac{19-23}{20}$. X. 30.

Вод. въ Воспочномъ океанѣ около Камчатки. Спина синеватая, а прочее тѣло желтовато-сребристое.

55. *Т. большоголовая* (*G. macroserphalus, Tilesii*). Голова и ротъ очень большіе и широкіе опличаютъ ее отъ всѣхъ породъ; вторая распорка брюшнаго пера длиннѣе прочихъ, щетиновидная, кривая. Дл. отъ 12 до 24 дюйм.

Вод. около Камчатки въ Воспочномъ океанѣ. Она очень похожа на *Т. пеструю*, но только шуловище у большоголовой одноцвѣтное.

56. *Т. тонкая* (*G. gracilis, Tilesii*). Рыло остроконечное; шуловище сжатое: спина темная, бока золотистые съ темными крапинками, а брюхо бѣлое. Дл. около 16 дюймовъ.

Вод. въ Воспочномъ океанѣ около Камчатки, *Тилезій*. — Новая ли это порода, или есть только выродокъ *Т. обыкновенной*?

57. *Т. Навага* (*G. Navaga, Pall.*). Верхняя челюсть длиннѣе нижней; боковой рубецъ около порошцы закривляется внизъ. Дл. около 8 д.

С. I-ое 14. II-ое 21. III-ье 17. Г. 17. Б. 6. П. $\frac{20}{19}$. X. 29 — 30.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ. Спина сѣрая съ темными пятнами, а бока серебристые съ черными крапинками. Не есть ли она выродокъ *Т. пестрой*?

58. *Т. мѣдянистая* (*G. Chalcogrammus, Pall.*). Нижняя челюсть безъ усика и длиннѣе верхней; хвостъ развилстый. Дл. около 2 ф.

С. I-ое 13. II-ое 15. III-ье 20. Б. 6. П. $\frac{21}{20}$. X. . . .

Вод. въ Охотскомъ морѣ и около Камчатки. Спина темная, на бокахъ двѣ полоски золотистыя прерывчатыя; брюхо бѣлое.

59. *Т. Сайда* (*G. Saida, Lerechin*). Боковой рубецъ прямой; вторая распорка брюшныхъ перьевъ оканчивается длинною щепинкою; нижняя челюсть съ усикомъ и нѣсколько длиннѣе верхней. Дл. около 8 дюймовъ.

С. I-ое 10 — 11. II-ое 16 — 17. III-е 20. Г. 16. Б. 5 — 6. П. $\frac{18}{20}$. X. 24 — 26.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Бѣломъ морѣ. Спина темная съ крапинками, бока синеватые, брюхо бѣлое. Хвостъ развилыстый.

60. *Т. маленькая* (*G. pygmaeus, Pall.*). Съ усикомъ на нижней челюсти, рыло кругловатое; хвостъ цѣльный. Дл. $7\frac{1}{2}$ д.

С. I-ое 16. II-ое 16. III-е 19. Г. 17. Б. 6. П. $\frac{18}{15}$. X. 28.

Вод. въ Восточномъ океанѣ. Меркз.

* * *Н а с п и н ь д в а п е р а.*

61. *Т. коемзатая* (*G. Fimbria, Pall.*). На нижней челюсти усика нѣтъ; боковой рубецъ совершенно прямой; спинное послѣднее перо и хвостовое раздвоенное съ бѣлою коймою. Дл. около 2 ф.

С. I-ое 20. II-ое 17. Г. 16. Б. 6. Пр. 20. X. . . .

Вод. въ Восточномъ океанѣ. Меркз. Туловище сжатое, сверху темное.

62. *Т. бородчатая* (*G. barbatus, L.*). Туловище широкое; верхняя челюсть длиннѣе нижней, имѣющей усикъ и 14 дырочекъ; края всѣхъ плавательныхъ перьевъ, исключая грудныхъ и брюшныхъ, черныя. Дл. около 18 д.

С. I-ое 13. II-ое 19. III-е 18. Г. 18. Б. 6. П. $\frac{25}{17}$. X. 70.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ. *Fauna Fenn.*

63. *Т. зеленая* (*G. virens*, *L.*). Обѣ челюсти одинаковой длины; боковой рубецъ бѣлый; спина зеленая; хвостъ раздвоенный. *Дл.* около 17 д.

С. I-ое 13. II-ое 20. III-ье 19. *Г.* 17. *Б.* 6. *П.* $\frac{20}{24}$. *Х.* 40.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ. *Fauna Fenn.*

Р. XVII. НАЛИМЪ (*Enchelyopus*, *Schneider*).

Отличается отъ Трески брюшными плавательными перьями, въ которыхъ 6 распорокъ, и шуловищемъ слизкимъ, нѣсколько сжатымъ; на спинѣ два пера, а у порошицы одно: хвостовое округленное (*).

64. *Н. Менюкъ* (*E. Lota*, *Schn.*; *Gadus Lota*, *L.*; *Die Quarre*; *La Lotte commune*). Челюсти ровныя; на нижней одинъ усикъ (рѣдко 2); шуловище песчрое. *Дл.* отъ 1 ф. до 3. (*Рис.* 17).

С. $\frac{14}{8}$. *Г.* 20. *Б.* 6. *П.* 67. *Х.* 36.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ всей почти Имперіи. Въ Малороссіи называютъ его *Менькомъ*, а около Р. Оки *Мантусомъ*.

65. *Н. Лохъ* (*E. Molva*, *Schn.*; *Gadus Molva*, *L.*). Челюсть верхняя длиннѣе нижней, снабжденной однимъ усикомъ; край всѣхъ плавательныхъ перьевъ, исключая грудныхъ и брюшныхъ, бѣлый. *Дл.* 2—3 ф.

С. $\frac{15}{8}$. *Г.* 19. *Б.* 6. *П.* 59. *Х.* 38.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и его заливахъ. *Fauna Fenn.*

66. *Н. усатый* (*E. Mustela*, *Schn.*; *Gadus Mustela*, *L.*). На верхней челюсти 4 усика, а на нижней 1; пер-

(*) Нѣкоторые *Налимы* живутъ въ прѣсныхъ водахъ, но другіе въ моряхъ; всѣ они доставляютъ вкусную пищу.

вое спинное перо все состоятъ изъ очень низкихъ и мягкихъ распорокъ. *Дл.* около 19 д.

С. $\frac{1}{42}$. *Г.* 14. *Б.* 6. *П.* 46. *Х.* 20.

Вод. въ Балпійскомъ морѣ и его заливахъ; въ озерѣ Пейпусъ. *Фишеръ.*

67. *Н. одноперый* (*E. mediterraneus*, *Schn.*; *Gadus jubatus*, *Pall.*; *G. mediterraneus*, *L.*). *На спинѣ одно только плавательное перо; на нижней челюсти одинъ усикъ. Дл.* около 10 д.

С. 60—63. *Г.* 16. *Б.* 5—6. *П.* 49. *Х.* 22.

Вод. около береговъ Крымскихъ въ Черномъ морѣ. Туловище желшоватое съ темными поясами.

Р. XVIII. СЛИЗНЯКЪ (*Blennius*, *L.*).

Голова толстая; жаберныхъ распорокъ 6—7; туловище сжатое; *брюшныя перья* лежатъ предъ грудными и состоятъ только изъ двухъ распорокъ (*).

68. *С. Собачка* (*B. sanguinolentus*, *Pall.*). *Усики*, находящiеся надъ глазами, маленькiе и раздѣляются на 4 частицы; туловище брюшистое въ пиянахъ: спина острая. *Дл.* около 8 д.

С. 33. *Г.* 13. *Б.* 2. *П.* 22. *Х.* 12.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Спина темная, а бока синеватые.

69. *С. темный* (*B. Varus*, *Pall.*). Спина закругленная; верхушки *усиковъ* надъ глазами находящiеся

(*) *Слизняки* суть рыбы продолговатыя, покрытыя мѣкими чешуйками и слизкою кожею; спинныя перья у нихъ длинныя. Рыбы сi очень живущи, и будучи вынуты изъ воды, очень долго остающiя живыми. Нѣкоторыя изъ нихъ родятъ живыхъ дѣтей.

раздѣлены на 6 щетинокъ, а находящихся надъ поздыми на чешыре щепинки. Дл. 5 д.

С. 33. Г. 13. Б. 2. П. 20. X. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Темный съ черными пятнами.

70. *С. красивый* (B. lepidus, Pall.); рыжеватый, съ кожистымъ на голову рубцемъ; на шуловищѣ зеленые пояски, а на хвостѣ зеленые пятна. Дл. около $3\frac{1}{2}$ дюйм.

С. 35. Г. 13, Б. 2. П. 24 — 25. X. 13.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. На голове 2 черныхъ пояска,

71. *С. ушастый* (B. auritus, Pall.). Усики, надъ глазами находящійся, цѣльный; шуловище и плавательныя перья въ черныхъ пятнахъ: брюшныя перья длинноватые, усасто - раздвоенныя. Дл. $2\frac{1}{2}$ дюйма,

С. 30, Г. . . . Б. 2. П. 17. X. . . .

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Шуловище сѣроватое.

72. *С. ошковый* (B. Gunellus, L.). На спинномъ перѣ десять пятенъ черныхъ съ бѣлымъ ободкомъ. Дл. 6 — 9 дюйм.

С. 77—78. Г. 10. Б. 9. П. 42—43. X. 16—18.

Вод. въ Черномъ морѣ по свидѣн. Палласа, и около Камчатки по свидѣн. Тилезіуса. Желтоватый или зеленоватый съ пятнами.

73. *С. гребенчатый* (B. Galerita, L.) отличается отъ другихъ кожаными поперечными красноватыми на голову гребнями. Дл. 4-5 дюйм.

С. 50—60. Г. 10. Б. 2. П. 36. X. 16.

Вод. около Камчатки. Стеллеръ.

74. *С. безбрюхоперый* (*B. alectorolophus*, *Pall.*). Вдоль головной макушки идетъ кожаный гребень цѣльный; *брюшныхъ перьевъ нѣтъ*, а хвостовое перо почти срослося съ перьями спиннымъ и проходнымъ. *Дл.* 5. дюйм.

С. 63. *Г.* о. *Б.* о. *П.* 44. *Х.* 13.

Вод. въ Пензинской Губѣ. *Меркѣ.* Спина темнооливковая, съ пятами свѣтло-зелеными. Сего ли рода?

75. *С. бородавчатый* (*B. Dolichogaster*, *Pall.*). Проходное плавапельное перо въ половину короче тѣла, хвостовое перо срослося съ спиннымъ и проходнымъ перьями; *вмѣсто брюшныхъ перьевъ двѣ бородавки.* *Дл.* около 12 дюйм.

С. 93. *Г.* 12. *Б.* о. *П.* 52. *Х.* 20.

Вод. около Камчатки и острововъ, между ею и Америкой лежащихъ. *Меркѣ.* Спина темнооливковая, а брюхо желтое; плавапельныя перья съ поясками.

76. *С. угревидный* (*B. anguillaris*, *Pall.*). Туловище очень длинное; *распорки* спиннаго плавапельнаго пера колючія, *проходнаго четыре-раздѣльныя*; хвостовое перо опидѣльное, желтоватое, съ черными поясками. *Дл.* 1½ фуша.

С. 67—70. *Г.* 14. *Б.* 2. *П.* 45—50. *Х.* 14.

Вод. около Камчатки и острововъ, между ею и Америкой лежащихъ. *Меркѣ.* Оливковое туловище съ опидѣлкою желтизны и съ черными поясками; брюхо желтое.

77. *С. розовый* (*B. roseus*, *Pall.*). Туловище длинное узкое, *розоваго цвѣту*; *вмѣсто брюшныхъ перьевъ двѣ колючки*; хвостовое перо оспроватое срослося съ перьями спиннымъ и проходнымъ. *Дл.* 9. д.

С. 100. *Г.* 9. *Б.* 2. *П.* 90. *Х.* . . .

Вод. около Курильскихъ острововъ.

78. *С. полосатый* (В. Taenia, Pall.). Похожъ на Ж. розоваго, но *хвостовое перо* у него *закругленное* и не сросшееся съ другими перьями. Дл. около 9 д.

С. 87. Г. . . . Б. 2. П. 47. Х. . . .

Вод. около Курильскихъ острововъ.

79. *С. многоусый* (В. polyactosephalus, Pall.). Надъ глазами *четыре усика большихъ одновѣтвистыхъ*, а на макушкѣ 8 цѣльныхъ. Дл. 12 д.

С. 60. Г. . . . Б. . . . П. . . . Х. 13.

Вод. около Камчатки. Описанъ Палласомъ не совершенно, и едва ли принадлежишь къ сему роду.

80. *С. живородящій* (В. viviparus, L.). Верхняя челюсть длиннѣе нижней; ноздри *трубчатые*; *туловище желтоватое съ темными пятнами*; *проходное перо* срослось съ *хвостовымъ*. Дл. около 15 д. (Рис. 18).

С. П. и Х. вмѣстѣ имѣють 148 распорокъ Г. 20. Б. 2.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и его заливахъ. Фауна Финн.

Р. XIX. СМОЧНИКЪ (Trachinus, L.).

Голова сжатая; *порошица почти близъ грудныхъ перьевъ*; спинныхъ перьевъ два, изъ копорыхъ второе, равно какъ и *проходное* очень длинная (*).

81. *С. Драконъ* (Т. Draco, L.; Das Petermenchen, La Vive ordinaire). Цвѣтомъ желтоватый. Дл. около 1 ф. (Рис. 19).

(*) *Смочники* суть рыбы морскія, у которыхъ въ жаберной перепонкѣ 6 распорокъ, первое спинное перо колючее и состоящее изъ весьма немногихъ распорокъ. Мясо сихъ рыбъ вкусное.

С. $\frac{5-6}{24-30}$. Г. 16. Б. 6. П. 25. X. 12—15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крымскихъ береговъ.

Р. XX. КРАСУНЪ (*Callyonimus*, L.)

Голова продолговатая, плоская: глаза лежатъ на самой макушкѣ и очень близко одинъ отъ другаго; жаберное отверстие маленькое, по той причинѣ, что крышечка совершенно почти приросла къ кожѣ: въ жаберной перепонкѣ 4 распорки; брюшныя плавательныя перья большія и сидятъ почти на глоткѣ (*).

82. *К. нарядный* (*C. festivus*, *Pall.*). Туловище и плавательныя перья съ желтыми полосками; второе спинное перо очень большое. Дл. около 5 д.

С. $\frac{4}{7}$ Г. 19. Б. 6. П. 9. X. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Туловище желтоватое съ глазками.

83. *К. Лица* (*C. Lyra*, L.; *Der Spinnen*; *Le Lacert*). Распорка первого спиннаго пера длиною во все тѣло. Дл. 12—14 дюм. (*Рис.* 20).

С. $\frac{4}{10}$ Г. 18. Б. 6. П. 10. X. 9.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и его заливахъ. Рецъ.

П О Р Я Д О К Ъ V.

Р. К. ГРУДОПЕРЫЯ (*P. Thoracici*.)

У сихъ рыбъ брюшныя перья подъ грудными и на грудной кости.

(*) Рыбы сіи очень красивы какъ расположеніемъ своихъ плавательныхъ перьевъ, такъ и красками голаго своего туловища; живутъ въ моряхъ. Хвостовое перо у нихъ округленное.

* Р. Г. м л е к о п е р ы я.

Р. XXI. К А М Б А Л А (*Pleuronectes*, L.).

Главный опличительный признакъ сего рода рыбъ состоишь въ томъ, что глаза у нихъ на одной только сторонѣ тѣла, которое очень плоско (*).

А. Глаза на левой сторонѣ тѣла.

84. К. звездчатая (*P. stellatus*, *Pall.*). На всемъ тѣлѣ косяныя шишечки колючія, звездчатые; плавательныя перья съ большими и черными пятами. Дл. около 20 дюйм.

С. 56—59. Г. 12. Б. 6. П. 37—44. Х. 18.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Камчатки, острововъ Курильскихъ и другихъ. Верхняя часть тѣла оливковая, а нижняя бѣловатая.

85. К. Полурыбокъ (*P. Macoticus*, *Pall.*). Все тѣло усажено щипками, имѣющими косяную верхушку островатую; брюшныя перья широкія. Дл. $1\frac{1}{2}$ фута.

С. 62. Г. 10—12. Б. правая 5, а лѣвая 6 р. П. 46. Х. 17.

Вод. въ Черномъ морѣ, а особливо въ заливахъ моря Азовскаго. Цвѣтъ дымчатый.

86. К. Ромбоидальная (*P. Rhombus*, L.; *Das Viebeck*; *Le Carrelet*). Туловище очень широкое, гладкое; боковой рубецъ при самомъ началѣ закривлень, а потомъ идетъ прямо.

(*) Камбалы суть морскія рыбы, совершенно плоскія; у нихъ верхняя сторона, на которой и глаза, цвѣтная, а нижняя безъ глазъ и всегда бѣловатая. Спинное перо занимаетъ всю почти спину. По неимѣнію воздушнаго пузыря, сн рыбы рѣдко оставляющъ дно моря. Въ жаберной ихъ перепонкѣ 6 расщелей. Мясо нѣкоторыхъ вкусно.

С. 71. Г. 12. Б. 6. П. 60. X. 18.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и его заливахъ.
Fauna Fenn. Верхъ туловища и плаващельныя перья
песпрыя.

87. *К. огромная* (*P. maximus*, *L.*; *Der Steinbutt*; *Le Turbot*). Туловище широкое, устьянное костяными
шешечками; боковой рубецъ при началѣ закривлен-
ный. Дл. около 2 ф.

С. 67. Г. 10. Б. 6. П. 46. X. 15.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и его заливахъ.
Fauna Fenn. Верхъ шѣла и низъ песпрые.

88. *К. рябая* (*P. Passer*, *L.*; *Die Stachelbutte*; *Le Moineau*). Боковой рубецъ почти прямой и близъ го-
ловы только колючій. Дл. около 1 фуша.

С. 59. Г. 11. Б. 6. П. 44. X. 16.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ и его заливахъ.
Fauna Fenn. Сверху песпрая, съисподи бѣлая.

Б. Глаза на правой сторонѣ шѣла.

89. *К. Палтусъ* (*P. Hippoglossus*, *L.*; *Der heilige Butt*; *Le Fletan*). Туловище продолговатое, глад-
кое; хвостовое перо луновидное. Дл. около 1. арш.
и болѣе.

С. 98. Г. 15. Б. 6. П. 80. X. 18.

Вод. въ Сѣверномъ и Воспочномъ океанахъ.
Верхняя часть шѣла шемная.

90. *К. шероховатая* (*P. Solea*, *L.*; *Die Zunge*; *La Sole*). Туловище продолговатое, покрытое шерохова-
тыми чешуями; верхняя челюсть длиннѣ нижней.
Дл. около 2. фуш.

С. 81. Г. 10. Б. 7. П. 61. X. 17.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ. Туловище сверху
шемное.

91. *К. желтая* (P. Limanda, L.; Die Kliesehe; La Limande). Туловище яицевидное, желтое; голова маленькая, чешуйчатая: зубы шупые; хвостовое перо съ небольшою выемкою.

С. 75. Г. 11. Б. 6. П. 61. X. 15.

Вод. въ Балпійскомъ морѣ и его заливахъ. *Fauna Fenn.*

92. *К. Полурыбница* (P. Flesus; Der Theerbut; Le Flez.). Туловище продолговатое; боковой рубецъ шероховатый; при корнѣ длинныхъ плавательныхъ перьевъ шипы. Дл. около $1\frac{1}{2}$ ф. (Рис. 21).

С. 55—63. Г. 10. Б. 5. П. 39—42. X. 17—19.

Вод. въ Балпійскомъ, Сѣверномъ, Бѣломъ и Азовскомъ моряхъ. Верхняя часть шѣла темная съ синеватыми крапинами.

93. *К. пестрая* (P. Platessa, L.; Die Scholle; La Plie). Туловище овальное гладкое; на головѣ шесть костяныхъ шишекъ. Дл. около 2. ф.

С. 68. Г. 12. Б. 6. П. 54. X. 19.

Вод. въ Балпійскомъ и Сѣверномъ моряхъ. Туловище сверху свѣпосѣрое съ красноватыми пятнами.

94. *К. шишковатая* (P. quadrituberculatus, Pall.). Глаза и 4 костяныхъ шишки на правой сторонѣ головы; туловище очень гладкое. Дл. около 12 д.

С. 70. В. 11. Б. 6. П. 51. X. 18.

Вод. въ Восточномъ морѣ около Камчатки.

95. *К. льдистая* (P. glacialis, Pall.). Туловище нѣсколько шероховатое; на головѣ жесткая костяная сплошная складка; у длинныхъ плавательныхъ перьевъ распорки шероховатая. Дл. около 5 д.

С. 54—56. Г. 12. Б. 0. П. 39. X. 18.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ около Карской и Обской губы.

96. *К. шершавая* (*P. cicatricosus*, *Pall.*). На головѣ костяный рубецъ продолговатый и очень жесткій; *чешуи, разбросанныя по тѣлу, щетинисто-колюгія*; распорки у плавательныхъ перьевъ широковатые. *Дл.* около 9 дюйм.

С. 59. Г. 7. Б. 6. П. 36. X. 14.

Вод. въ Восточномъ океанѣ. *Меркз.* Верхняя часть тѣла желтоватая.

97. *К. жесткая* (*P. asper*, *Pall.*). Голова и распорки плавательныхъ перьевъ *чешуисто-широковатые*; передняя часть боковаго рубца выгнулась къ спинѣ дугою; чешуйки шероховатые. *Дл.* 9 д.

С. 67. Г. 12. Б. 6. П. 48. X. 18.

Вод. въ Восточномъ океанѣ. *Меркз.* Верхняя часть тѣла оливковая.

98. *К. носастая* (*P. nasutus*, *Pall.*). Верхняя челюсть длиннѣ нижней, тупая, мясистая и передняя часть головы усажена мягкими волосками. *Дл.* 6 д.

С. 48. Г. 6. Б. 4. П. 53. X. 18.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Верхняя часть тѣла темно-сѣрая.

99. *К. раскосая* (*P. luscus*, *Pall.*). Туловище продолговатое; *широковатые шипы при длинныхъ плавательныхъ перьяхъ и при боковомъ рубцѣ.* *Дл.* около 7 дюймовъ.

С. 62. Г. 12. Б. 6. П. . . X. 17.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Верхняя часть тѣла темно-сѣрая.

Р. XXII. КРАСНОБОРОДКА (Mullus, L.).

Голова почти четверо-угольная, нѣсколько сжатая, покрывающая чешуями; въ жаберной перепонкѣ три распорки; туловище круглопродолговатое, покрытое большими чешуями, легко спадающими; на спинѣ два пера; хвостъ раздвоенный (*).

100. *К. полосатая* (M. Surmuletus, L.; Der grose Rothbart; Le Surmulet). Краснорозоваго цвѣту, съ желтоватыми вдоль тѣла полосками. Дл. 1 футъ. (Рис. 22).

С. $\frac{7}{9}$. Г. 15. Б. 6. П. 7. Х. 22.

Попадаетъ изрѣдка въ Балтійскомъ морѣ.

101. *К. Султанская рыба* (M. barbatus, L.). Краснорозовая, безъ желтоватыхъ полосокъ. Дл. около 7 дюймовъ.

С. $\frac{7}{7}$. Г. 15. Б. 6. П. 7. Х. 17.

Вод. По тихимъ заливамъ Чернаго моря, особливо около Балаклавы.

Р. XXIII. Т Р И Г Л А (Trigla, L.).

Голова большая, покрывающая шероховатыми щипками; жаберныя закрышки колючія, въ жаберной перепонкѣ 7 распорокъ; при ерудныхъ плавательныхъ перьяхъ находятся колючія опѣльные косточки (**).

(*) *Краснобродки* принадлежатъ къ числу красивѣйшихъ Россійскихъ рыбъ. Онѣ живутъ въ моряхъ; на нижней челюсти у нихъ находящіяся по два длинныхъ усика. Мясо ихъ весьма вкусное.

(**) *Триглы* также суть весьма красивыя рыбы; у нихъ два спинныхъ пера опѣльныхъ: проходное перо длинное, хвостовое цѣльное. Онѣ живутъ въ моряхъ и употребляютъ въ пищу.

102. *Т. красная* (*T. Cuculus, L.; Der rothe See-hahn; Le Rouget*). Колѣнчатыхъ косточекъ близъ грудныхъ перьевъ при, на первомъ плавательномъ спинномъ перѣ черное пятно. Дл. около 1. ф. (*Рис. 23*).

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма, а особливо въ Севастопольскомъ портѣ. Спина красная.

103. *Т. прыгающая* (*T. Nuxa, Pall.*). Колѣнчатыхъ косточекъ близъ грудныхъ перьевъ при; грудныя перья очень велики (посредствомъ которыхъ она на нѣсколько аршинъ выпрыгиваетъ изъ воды); *спинная бороздка зубчатая*. Дл. болѣе 12 д.

С. $\frac{8}{16}$. Г. 11. Б. 6. П. 6. Х. 10.

Вод. въ заливахъ Чернаго моря около Крыма. Плаващельныя перья разноцвѣщныя.

XXIV. РАМША (*Cottus, L.*)

Голова шире пѣла, колючая; въ жаберной перепонкѣ шесть распорокъ; *спинныя* плаващельныя перья опѣлѣныя, числомъ два и больше (*).

104. *Р. бычокъ* (*C. Gobio, L.; Der Kaulkopf; Le Chabot*). *Голова съ двумя кривыми колюжками* близъ жаберной крышечки; въ первомъ спинномъ перѣ 7 распорокъ. Дл. 6 — 8 дюйм.

С. $\frac{7}{17}$. Г. 14. Б. 4. П. 12. Х. 12.

Вод. по каменистымъ рѣкамъ и озерамъ Россійскимъ и Сибирскимъ. Туловище темножелтое, песчрое; брюхо бѣлое. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называется и *Широколобкою*.

105. *Подкаменщикъ* (*C. quadricornis, L.*). *Голова* плоская шероховатая, на макушкѣ 4 колющихъ шиповъ; въ первомъ спинномъ перѣ 10 распорокъ. Дл. 7 дюйм.

(*) *Рамши* водятся въ моряхъ, рѣкахъ и озерахъ. Туловище у нихъ круглое, слизкое и къ хвосту гораздо тоньше. Грудныя перья у нихъ большія, а брюшныя о 3—4 распоркахъ. Многія употребляются въ пищу.

С. $\frac{9}{14}$. Г. 17. Б. 4. П. 14. Х. 12.

Вод. въ Финскомъ заливѣ, въ Байкалѣ, рѣкѣ Енисеѣ и другихъ, текущихъ въ Ледовиное море. Темнаго цвѣшу.

106. *Р. пестрая* (*C. anostomus*, *Pall.*). Голова въ видѣ параллелепипеда; на жаберныхъ крышечкахъ по двѣ колючки; нижняя челюсть перпендикулярная. Дл. около 7. дюйм.

С. $\frac{13}{15}$. Г. 16. Б. 5. П. 13. Х. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ. Желшоватая, сверху съ темными крапинками и съ 3-мя къ хвосту поясками; исподъ бѣлой.

107. *Р. Ряца* (*C. Scorpis*, *L.*; *Der See-Scorpion*; *Le Scorpion de mers*). Туловище безъ чешуекъ; голова со множествомъ шишечекъ; верхняя челюсть длиннѣе. Дл. $21\frac{1}{2}$ д. (*Рис.* 24).

С. $\frac{6}{16}$. Г. 17. Б. 3. П. 14. Х. 11.

Вод. въ Балтійскомъ, Бѣломъ, Ледовиномъ и Воспочномъ моряхъ. Сверху рыжеватая, съ темными пятнами.

108. *Р. Жаюкъ* (*C. Jaok*, *Cuvieri*; *C. Scorpis*, *Pall.*). Голова вмѣсто шишечекъ имѣетъ мѣлкія выпуклинны или зерна; повыше боковаго рубца рядъ круглыхъ, нѣсколько вогнутыхъ чешуекъ; въ первомъ спинномъ перѣ 7 распорокъ. Дл. около 2 ф.

С. $\frac{7}{15}$. Г. 17. Б. 3. П. 14. Х. 11.

Вод. въ Воспочномъ океанѣ около Камчатки. Рыжеватая съ темными пятнами.

109. *Р. многоугольная* (*C. Polyacanthosephalus*, *Pall.*). Голова весьма широкая, угласная: макушка съ 4 иллистыми шишечками, верхняя челюсть длиннѣе нижней; туловище гладкое. Дл. около 15 д.

С. $\frac{9}{14}$. Г. 17. Б. 5. П. 12. Х. 14.

Вод. въ Воспочномъ океанѣ. Сверху темно-желтая, а съисподи свѣшложелтая съ крапинами и пятнами:

110. *P. широкоголовая* (*C. platycephalus*, *Pall.*). Голова широкая, многоугольная съ чешырью выпуклинами: верхняя челюсть длинѣе нижней; на спинѣ примѣются весьма жесткія выпуклины, рядомъ сидящія, другія же поменьше ихъ безъ порядку окружающъ хвостъ. Дл. болѣе 1 фуша.

С. $\frac{7}{12}$. Г. 15. Б. 4. П. 12. Х. 10.

Вод. въ морѣ около Камчатки и въ морѣ Охотскомъ.

111. *P. Рогатка* (*C. Diceraus*, *Pall.*; *Synanceia Cervus*, *Tiles.*). По обѣимъ сторонамъ головы два закрученныхъ рожка; боковой рубецъ усаженъ колючими шишечками. Дл. около 9 дюйм.

С. $\frac{7-8}{16}$. Г. 16. Б. 2. П. 12. Х. 12.

Вод. въ морѣ около Камчатки. Вся пестрая, — Въ Камчаткѣ называютъ ее *Быкомъ*.

112. *P. пестичная* (*C. Pistilliger*, *Pall.*). Верхняя челюсть длинѣе нижней, макушка головы покрыта колючими выпуклинами; туловище безъ чешуй, но усажено коротенькими ниточками, имѣющими головки; плавательныя перья въ пятнахъ. Дл. 5 д.

С. $\frac{9-10}{15}$. Г. 16. Б. 5. П. 16. Х. 11.

Вод. около Камчатки въ Авачинскомъ заливѣ, Петропавловской гавани и проч. Туловище темное.

113. *P. Мертенсова* (*L. Mertensii*, *Suv.*). Голова гладкая безъ колючекъ при ноздряхъ; острие передней жаберной крышечки не достаеетъ до угла задней крышки. Дл. 8 дюймовъ.

С. $\frac{8}{15}$. Г. 18. Б. . . . П. 12. Х. 18.

Вод. около Камчатки. Мертенсѣ. Туловище пестрое.

114. *P. маленькая* (*C. minutus*, *Pall.*). Голова маленькая, съ двумя колючками; туловище голое съ

неправильными пятами; плаващельныя перья всѣ въ пятахъ. Дл. 3 дюйма.

С. $\frac{9}{13}$. Г. 14. Б. 2. П. 15. Х. 15.

Вод. въ Охотскомъ морѣ. Меркз.

Примѣч. Палласовъ: *Cottus villosa* (Zoographia Rosso-Asiatica. Т. III. pag. 129) описана Шеллеромъ весьма не совершенно и вѣроятно составилъ новый родъ, когда будешь порядочно узнана.

Р. XXV. КУЛНАГЪ (*Phalangista*, *Pall.*).

Туловище угласное, покрытое костяными щитками, опличаетъ сей родъ отъ рода Рамши, съ кошорымъ онъ очень сходенъ (*).

115. *К. осѣстровый* (*P. acipenserinus*, *Pall.*). Ротъ на нижней споронѣ челюсти и усаженъ множествомъ усиковъ; туловище осьми-угольное: углы колючіе зазубренные, боковой рубецъ не доходитъ до головы. Дл. около 9 дюйм.

С. $\frac{9}{8}$. Г. 17. Б. 2. П. 8. Х. 11.

Вод. около острова Уналашки. Меркз. Цвѣту сверху темно-сѣраго, а на прочихъ частяхъ желтоватаго.

116. *К. Японскій* (*Ph. Japonicus*, *Pall.*). Туловище осьми-угольное, съ шупыми на чешуяхъ колючками; на углахъ бровей по маленькому рожку, усиковъ около рта нѣтъ. Дл. 1 фут.

С. $\frac{6}{7}$. Г. 12. Б. 2. П. 8. Х. 12.

Вод. около Курильскихъ острововъ. Блѣдно-желтый.

(*) *Кулнаги* (симъ имеемъ Камчадалы называютъ одну породу сего рода) суть морскія небольшія рыбы; опличаются еще отъ *Рамши* меньшею головою и узкимъ рыломъ, грудными перьями и распорками, кошорыя у всѣхъ перьевъ просныя.

117. *К. Лисица* (Ph. Cataphractus, *Pall.*; Cottus Cataphractus, *L.*; Agonus, *Schneideri*). На нижней части головы, гдѣ и ротъ, близъ глотки множество усиковъ, на концѣ рыла двѣ загнутыя колючки; передняя часть шуловища 8-угольная, а задняя 6-угольная. Дл. около 6 д. (Рис. 25).

С. $\frac{5}{7}$. Г. 15. Б. 3. П. 6. Х. 10.

Вод. въ морѣ Бѣломъ, Сѣверномъ океанѣ и Восточномъ.

118. *К. обыкновенный* (Ph. loricatus, *Pall.*; Agonus dodecaëdron, *Tilesii*). Голова сплюснутая, нижняя челюсть длиннѣ верхней; шуловище осьми-угольное: углы зазубренные жесткіе, боковой рубецъ колючій, Дл. 7 дюйм.

С. $\frac{7}{4}$. Г. 15. Б. 2. П. 15. Х. 11.

Вод. въ морѣ, омывающемъ берега Камчатки. Казаки называютъ его въ Камчаткѣ *Лисицею*.

119. *К. веретенчатый* (Ph. fusiformis, *Pall.*; Agonus rostratus, *Tilesii*). Туловище осьми-угольное, очень тонкое, по срединѣ толще, а къ головѣ и хвосту тоннѣе; глаза на выкапѣ: нижняя челюсть длиннѣ верхней, очень узкая и закривляющаяся къ верхней.

С. $\frac{3}{8}$. Г. 15. Б. 2. П. 13. Х. 10.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Курильскихъ острововъ. Меркѣ.

120. *К. четырехрогий* (Ph. quadricornis, M. Aspidophorus quadricornis, *Cuv.*). Рыло короткое: надъ бровями по рожку, а на запылкѣ два рожка; все туловище покрыто маленькими щитками. Дл. $3\frac{1}{2}$ д.

С. $\frac{9}{15}$. Г. 12. Б. 4. П. 10. Х. 12.]

Вод. въ морѣ около Камчатки. Кюве.

Р. XXVI. ГИКЖАКТЪ (Hemilepidotus, *Tiles.*)

На жаберныхъ крышкахъ три большія колючки боковыя и одна нижняя; шуловище близъ верх-

нихъ плаващельныхъ перьевъ покрытое вдоль чешуями и пониже боковаго рубца также покрытое нѣсколькими рядами чешуекъ, прочее же просранство голое; опличающъ сей родъ отъ другихъ (*).

121. *Г. Тилезіевъ* (H. Tilesii, Cuvier; Cottus hemilepidotus, Tilesii; Cottus trachurus, Pall.). Туловище песпрое. Дл. $7\frac{1}{2}$ дюйм. (Рис. 26).

С. $\frac{11}{18}$. Г. 17. Б. 4. П. 15. Х. 12.

Вод. въ Охотскомъ морѣ и около Камчатки.

Р. XXVII. СКОРПЕНА (Scorpena, L.).

Голова вся въ колючкахъ и усикахъ, шире тѣла; грудныя перья очень широкія; туловище покрытое чешуями (**).

122. *С. морской Ершъ* (S. Porcus, L.; Der Kleinschuppige Drachenscorf; La Scoréne). Вся песпрая, брюшныя плаващельныя перья красивыя. Дл. около 1 ф. (Рис. 27).

С. $\frac{12}{21}$. Г. 16. Б. 4. П. 8. Х. 18.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Мясо вкусное.

Р. XXVIII. ТОНКОЗУБЪ (Trichodon, Cuv.)

Голова сверху плоская, ротъ верпикальный, жаберныя крышечки колюія; туловище голое; спинныхъ плаващельныхъ перьевъ два (**).

(*) Сии рыбы, походяція видомъ на Рамшъ и Скорпенъ, живушъ въ моряхъ и еще очень мало изслѣдованы.

(**) У сихъ рыбъ голова чрезвычайно страшная, вся покрытая колючками, усиками и другими наростами, а особливо подъ глазами, на щекахъ и запылкѣ, что придаетъ имъ безобразный и даже страшный видъ. Онѣ водятся только въ моряхъ.

(***) Тонкозубы суть рыбы морскія, не довольно еще изслѣдованныя, и копорыхъ одна только порода сдѣлалась нѣсколько навѣстною.

123. *Т. Стеллеровъ* (*T. Stelleri*, *Cuv.*; *Trachinus Trichodon*, *Pall.*). Спина темно-сѣрая, а брюхо бѣлое. Дл. отъ 7 до 10 дюйм. (*Рис.* 28).

С. $\frac{14}{17}$. Г. 23. Б. 6. П. 29—30. Х. 13.

Вод. въ Восточномъ морѣ около Камчатки.

Р. XXIX. КАНШИКЪ (*Blepsias*, *Cuv.*)

Голова сжатая; жаберныя крышечки колючія, мясистые усики окружаютъ ротъ со всѣхъ сторонъ; спинное перо не ровное; въ жаберной перепонкѣ пять распорокъ ().*

124. *К. тридольный* (*B. trilobus*, *Cuv.*; *Trachinus cirrhosus*, *Pall.*). Спинное плавающее перо раздѣлено на три доли. Дл. $5\frac{1}{2}$ д. (*Рис.* 29).

С. $\frac{7}{24}$. Г. 11. Б. 4. П. 20. Х. 11—13.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Камчатки и въ Пензенской Губѣ.

125. *К. двудольный* (*B. bilobus*, *Cuv.*). Опличається отъ тридольнаго спиннымъ перомъ, раздѣленнымъ только на двѣ доли. Дл. $5\frac{1}{2}$ д.

С. $\frac{3}{11}$. Г. 14. Б. 4. П. 19. Х. 13.

Вод. въ Восточномъ морѣ около Камчатки. *Кювье.*

Р. XXX. КОЛЮШКА (*Gasterosteus*, *L.*).

Туловище ланцетовидное: при хвостѣ съ обѣихъ сторонъ острѣе, на спинѣ передъ плавающимъ

(*) И сіи морскія рыбы еще весьма не совершенно изслѣдованы. Первую породу открылъ *Стеллеръ*, а вторую *Жолие*.

нымъ перомъ нѣсколько отдѣльныхъ колючекъ; на брюхѣ вмѣсто перьевъ двѣ колючки (*).

126. *К. обыкновенная* (*G. pungitius*, *L.*; *Gasterocanthus pungitius*, *Pall.*; *Die kleine Seestichling*; *La petite Erinoche*). На спинѣ десять колючекъ. Дл. $1\frac{1}{2}$ дюм. (*Рис. 30, ф. 1*).

С. $\frac{10}{11}$. Г. 10. Б. 2. П. 11. Х. 13.

Вод. въ моряхъ Черномъ и Охотскомъ и во многихъ рѣкахъ Россійскихъ и Сибирскихъ. Туловище голое серебристаго цвѣту.

127. *К. колючая* (*G. aculeatus*, *L.*; *Gasteracanthus aculeatus*, *Pall.*; *Die Stichling*; *L. L'Erinoche*). На спинѣ при колючки; туловище голое, серебристаго цвѣту. Дл. около 3 дюйм. (*Рис. 30, ф. 2*).

С. $\frac{3}{12}$. Г. 10. Б. 2. П. 9. Х. 12.

Вод. въ моряхъ, сѣверныхъ озерахъ и въ рѣкахъ всей почти Имперіи.

128. *К. Хахалъа* (*Gasterocanthus cataphractus*, *Pall.*) На спинѣ при колючки; туловище покрыто костяными пластинками. Дл. около 5 д.

С. $\frac{3}{11}$. Г. 10. Б. 2. П. 10. Х. 11.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Камчатки. Серебристаго цвѣту.

Р. XXXI. Е Р Ш Ъ (*Asarina*, *Cuvier*).

Голова голая со впадинами или ямками: на краяхъ жаберныхъ крышечекъ 8 или 10 маленькихъ

(*) *Колючки* суть мѣлкія рыбки, живущія въ моряхъ, озерахъ и рѣкахъ. Голова у нихъ продолговатая гладкая, въ жаберной перепонкѣ по 3—7 распорокъ; брюшныя колючки близъ грудныхъ перьевъ на грудной кости.

колючекъ; *спинныя* плаващельныя перья составляють одно перо (*).

129. *Е. обыкновенный* (*A. vulgaris*, *Cuv*; *Perca serena*, *L.*; *La Kaulbarsch*; *Die Perche goujonniere.*). У спиннаго пера 27 распорокъ, изъ числа которыхъ передніе 15 колюгіе. Длин. отъ 4 до 8 д. (Рис. 31).

С. 27. Г. 14. Б. 6. П. 7. Х. 17.

Вод. въ рѣкахъ всего почти Государства. Спина темная, иногда зеленоватая; на бокахъ темныя пятна или красныя.

130. *Е. Бабиръ* (*A. Rossica*, *Cuv*; *Perca Aserina*, *L.*). У спиннаго пера 30 — 33 распорки, изъ числа коихъ переднія 17 колюгія. Дл. отъ 4 до 8 д.

С. 30 — 33. Г. 25. Б. 6. П. 7 — 9. Х. 17.

Вод. въ Азовскомъ морѣ и въ рѣкахъ Южной Россіи, а особливо впадающихъ въ Черное и Азовское моря.

Р. XXXII. О К У Н Ъ (*Perca L.*)

На жаберныхъ крышечкахъ находятся колюжки или зубчики: голова не покрыта чешуйками; въ брюшныхъ мягкихъ перьяхъ по пяти распорокъ; спинныхъ перьевъ два или одно но съ глубокою выемкою, просширающеюся даже до самаго основанія перьевъ (**).

(*) *Ершей* отъ *Окуней*, къ которымъ причислили ихъ *Линней* и другіе, *Кювье* опредѣлилъ единственно по головѣ ихъ со впадинами и по спиннымъ перьямъ, соединеннымъ въ одно перо.

(**) У всѣхъ *Окуней* въ жаберной перепонкѣ по 7 распорокъ, и ротъ снабженъ зубами, у нѣкоторыхъ породъ довольно большими. Окунь живутъ и въ моряхъ и въ рѣкахъ, и доставляютъ здоровую и вкусную пищу.

131. *О. рѣзный* (*P. fluviatilis*, *L.*; *Die Flussbarsche*; *La Perche commune.*). У обѣихъ спинныхъ перьевъ по четырнадцати распорокъ; на шлѣ темныя пояски, не доходящіе до брюха. Дл. отъ 1 до 2 фушовъ. (*Рис. 32*).

С. $\frac{14-15}{14}$. Г. 14. Б. 5. П. 10—11. Х. 17.

Вод. по рѣкамъ и озерамъ всей почти Имперіи. Спина зеленовато-золотистаго цвѣту, съ темными поясками (числомъ 3—5), бока желтоватыя; брюхо бѣлое; нижнія плавательныя перья красныя.

132. *О. Судакъ* (*P. Lucioperca*, *L.*; *Der Zander*; *Le Sandre*). Зубы во рту большіе, конические, отдѣльные; плавательныя перья въ пятинахъ; шуловище сѣрое. Длинною отъ 2 до 3 фуш.

С. $\frac{14}{23}$. Г. 15. Б. 7. П. 14. Х. 22.

Вод. въ Каспійскомъ, Черномъ и Азовскомъ моряхъ и во всѣхъ большихъ рѣкахъ всей почти Россіи; есть и въ большихъ озерахъ.

133. *О. морской судакъ* (*P. Labrax*, *Pallasii*, non *Linnei*. *Lucioperca marina*, *Cuvieri*). Челюсти одинакой длины; спинныя плавательныя перья сплошныя: въ первомъ перѣ 13 колючихъ распорокъ. Дл. отъ 2 до 3 фуш.

С. $\frac{15}{12}$. Г. 12. Б. 5. П. 13. Х. . . .

Вод. въ Теодосіевскомъ заливѣ Чернаго моря? Видомъ и цвѣтомъ похожъ на Судака. *Палласъ*. Надобно ожидать о сей рыбѣ вѣрнѣйшихъ описаній отъ самовидцевъ.

134. *О. Бершикъ* (*Perca Volgensis*, *Pall. et Gmel.* *Lucioperca Volgensis*. *Cuv.* *Schilus Pallasii*; *Krinitzki*) (*).

(*) Г. Адъюнктъ Харьковскаго Университета, *Криницкій*, описалъ сію рыбу подъ именемъ *Schilus Pallasii* съ хорошимъ изображеніемъ, въ *Nouveaux Mémoires de la Société Imperiale des Naturalistes de Moscou*, Tom. II. pag. 443. tab. XXV.

Весьма похожа на Судака, но отличается отъ него цвѣтомъ зеленоватымъ съ сѣрыми съ прожельбою, семью темными поясами, не доходящими до серебристаго брюха и мѣлыми во рту зубами. Дл. отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ фута.

С. $\frac{15}{24}$. Г. 15. Б. 6. П. 12. Х. 17.

Вод. въ Днѣпрѣ и Донѣ, и въ сихъ мѣстахъ извѣстенъ подъ именемъ *Секретъ*, по свидѣш. Г. Криницкаго. Есть и въ Волгѣ. Палласъ.

135. О. Усмакъ (P. variabilis, Pall.). Плавапельныя спинныя перья сплошныя, въ первомъ перѣ 12 распорокъ; нижняя челюсть длиннѣе верхней съ коническимъ кончикомъ, а верхняя съ выемкою. Дл. около 2 футовъ.

С. $\frac{12}{16}$. Г. 17. Б. 5. П. 10. Х. 12.

Вод. въ Восточномъ морѣ около Камчатки и острововъ, лежащихъ между Камчаткою и Америкою. Цвѣтомъ бываютъ синеватые и красноватые (*).

Р. XXXIII. С Ц І Е Н А (Sciaena, L.).

Рыло покрытое чешуйками и выдавшееся впередъ; спинное плавапельное перо одно; брюшныя перья лежатъ въ особой ямкѣ (**).

(*) Сія рыба также несовершенно еще извѣстна. Г. Тилезіусъ описалъ въ запискахъ Санктпетербургской Академіи Наукъ рыбу подъ именемъ *Epinephelis ciliatus*, которую почитаетъ за Палласова Усиака (P. variabilis); но потомъ самъ же думаетъ, что описанная имъ рыба принадлежитъ къ роду *Sparus*. См. Pallas Zoographia Rosso-Asiatica; Т. III. pag. 274. въ примѣчаніи. Вообще рыбы, описанныя подъ No 131, 132 и 133, можетъ быть принадлежатъ къ другимъ родамъ.

(**) *Sciaenae* суть морскія рыбы, которыхъ мясо очень вкусно. У всѣхъ ихъ на спинѣ находится бороздка, въ которую по волѣ

136. *С. голозубая* (*S. Gymnodon, Pall.*). Зубы выдаются из рта наружу; на лбу серебристое пятно, в видѣ полумѣсяца; близъ брюшныхъ перьевъ три заостренные чешуйки. Дл. около 7 д.

С. 22. Г. 16. Б. 6. П. 12. Х. 20.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Вся золотистаго цвѣту, но спина нѣсколько темноватая.

137. *С. чернохвостая* (*S. melanura, Pall.*). Туловище широкое, серебристое; близъ брюшныхъ перьевъ находится колючка, а близъ хвостоваго пера черное пятно. Дл. около 8 д.

С. 24. Г. 14. Б. 6. П. 14. Х. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ близъ Крыма.

Р. XXXIV. КОРАЦИНЪ (*Coracinus, Pall.*).

Голова толстая, чешуйчатая; жаберныя крышечки чешуйчатые; въ жаберной перепонкѣ 5 распорокъ; спинное перо сплошное, но съ большою по срединѣ выемкою; первая распорка у проходнаго пера толстая, костяная (*).

138. *К. сжатый* (*C. Chalcis, Pall.*). Туловище блестящее сжатое; на нижней челюсти нѣтъ усика. Дл. 16 д.

С. 33. Г. 14. Б. 6. П. 8. Х. 16.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма, а особливо около Алушки.

рыбы вкладывается спинное перо. На брюхѣ для брюшныхъ перьевъ такой же находится желобокъ; хвостовое перо раздвоенное.

(*) Родъ *Корацина* опредѣленъ Палласомъ, но и по сомнѣнію; это рыбы морскія, имѣющія очень вкусное твердое мясо; кромѣ Палласа ни кѣмъ не описаны.

139. *Ж. кругловатый* (C. Voors, Pall.). Туловище синеватое, кругловатое; на нижней челюсти коротенький усикъ. Дл. около 2 футовъ.

С. 31. Г. 13. Б. 6. П. 6. Х. 17.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма, а особливо въ Феодосіевскомъ портѣ.

Р. XXXV. Г У Б А Ч Ъ (Labrus, L.).

Губы толстыя мясистыя, покрывающія губныя кости; въ жаберной перепонкѣ пятъ распорокъ; зубы конические и цилиндрическіе, различной величины; боковой рубецъ идетъ параллельно со спиною, а при началѣ хвоста вдругъ поворачивается къ низу и идетъ по бокамъ хвоста ().*

140. *Г. красивый* (L. Polychrous, Pall.). Зеленоватого цвѣту; грудныя плавательныя перья яркаго желтаго цвѣту, а прочія синяго; боковыя полосы окружены красными пятнами; черное пятно близъ жаберныхъ крышечекъ и такое же близъ хвостоватаго пера. Дл. около 1 фута.

С. 26. Г. 14. Б. 6. П. 13. Х. 13—15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Цвѣтъ шѣла по возрасту рыбъ измѣняется.

141. *Г. зеленоватый* (L. aequinosus, Pall.). Темно-рыжеватый съ зеленымъ на каждой чешуѣ пятномъ и съ такими же полосками на бокахъ головы; на концѣ спиннаго пера два темныхъ пятна. Дл. около 6 дюймовъ.

С. 25. Г. 13. Б. 6. П. 13. Х. 13.

(*) *Губачи* суть морскія рыбы, красивыя и очень вкусныя. Г. Палласъ полагаетъ надежнѣйшимъ опланиченнымъ ихъ признакомъ отъ смежныхъ породъ, боковой рубецъ, вдругъ близъ хвоста круто поворачивающійся внизъ.

Вод. въ Черномъ морѣ около Южной части Крыма. Всѣ плавательныя перья, выключая грудныхъ, голубоватыя.

142. *Г. темный* (*L. fuscus, Pall.*). Желтоватый, съ темными на бокахъ полосками; на хвостѣ черное пятно. *Дл.* около 4 д.

С. 24. Г. 18. Б. . П. X. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Южной части Крыма.

143. *Г. сѣрый* (*L. cinereus, Pall.*). Сѣроватый; черное пятно на спинномъ плавательномъ перѣ и на верхнемъ краю хвоста; всѣ плавательныя перья красноваты. *Дл.* 6 дюйм.

С. 25. Г. 14. Б. 6. П. 10. X. . .

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

144. *Г. очковый* (*L. perspicillatus, Pall.*). Зеленый; голова съ красными и лазоревыми полосками; на жаберныхъ крышкахъ по черному пятну съ краснымъ ободкомъ, на срединѣ хвоста черное пятно. *Дл.* около 7 дюйм.

С. 23. Г. 13. Б. 6. П. 11. X. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Плавательныя перья зеленоватыя.

145. *Г. пестрый* (*L. capistratus, Pall.*). Зеленоватый, съ темными пятнами; на головѣ косыя темныя полоски съ зеленоватыми краями; близъ хвостоваго пера черное пятно. *Дл.* около 7 дюйм.

С. 23. Г. 13. Б. 6. П. 11. X. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

146. *Г. крапивный* (*L. fraenatus, Pall.*). Желтоватый, съ темными пятнами; на жаберныхъ крышечкахъ по три косыхъ темныхъ прерывчатыхъ полосокъ; по срединѣ хвоста темное пятно. *Дл.* около 2 дюйм.

С. 23. Г. 13. Б. . . . П. 11. X. 13.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

147. *Г. курносый* (L. *simus*, *Pall.*). *Блѣдно-желтоватый*; передъ глазами черная полоска, близъ хвостоваго пера по два черныхъ пята; *плавательныя перья полосатыя*. *Дл.* около 7 дюйм.

С. 24. Г. 13. Б. 6. П. 12. X. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

148. *Г. оливковый* (L. *prasostictes*, *Pall.*). *Туловище* продолговатое, *оливковаго цвѣта*, а съисподи желтовато-сребристое, вездѣ усыянное *лазоревыми крапинами*. *Дл.* около 9 дюйм.

С. 31. Г. 15. Б. 6. П. 11—13. X. 15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. *Плавательныя перья* желтоватыя съ лазоревыми крапинами.

Р. XXXVI. ТЕРПУКЪ (Lабрах, *Pall.*).

Туловище продолговатое; главный же опличительный признакъ состоить въ *нѣсколькихъ рядахъ скважинъ*, подобныхъ боковому рубцу, или представляющихъ нѣсколько боковыхъ рубцовъ (*).

149. *Т. тупоголовый* (L. *lagocerphalus*, *Pall.*). *Голова толстая тупорылая*, *туловище гладкое*, (у чешуекъ нѣтъ по краямъ щетинокъ); боковыхъ швовъ (рубцовъ) на обоихъ бокахъ около шести; спинныя плавательныя перья почти соединены вмѣстѣ. *Дл.* около 2 ф.

(*) *Терпуки* (Терпути) суть морскія рыбы, довольно толстыя, покрытыя мѣлкими чешуями, которыя у большаго числа породъ имѣють по краямъ щетины; въ жаберной перепонкѣ отъ 5 до 6 распорокъ. *Ювье* въ своей *Исторіи рыбъ* описалъ ихъ къ другимъ родамъ.

С. $\frac{20}{24}$. Г. 19. Б. 5. П. 22. X. 17.

Вод. въ Восточномъ океанѣ около Курильскихъ острововъ. *Биллингс*. Туловище темновато-золотистое.

150. *Т. десятилинный* (L. decagrammus, *Pall.*). Голова коническая; боковыхъ швовъ или рубцовъ на обоихъ бокахъ по пяти: изъ числа брюшныхъ первый прерывается у брюшныхъ перьевъ, а потомъ опять продолжается до хвостового пера; оба спинныя плавательныя перья съ темными пятнами и соединяются между собою перепонкою. *Дл.* около 1 фуша.

С. $\frac{20}{24}$. Г. 24. Б. 6. П. 14. X. 16.

Вод. въ Восточномъ океанѣ. *Биллингс*. Туловище синеватое, съ темными пятнами около боковой средней линіи.

151. *Т. хохолковый* (L. superciliosus, *Pall.*). Оба плавательныя спинныя перья соединены между собою перепонкою; боковыхъ швовъ на обоихъ бокахъ по пяти; *надъ глазами родъ усиковъ дланевидныхъ*. *Дл.* около 1 ф.

С. $\frac{20}{23}$. Г. 19. Б. 5. П. 22. X. 16.

Вод. въ Восточномъ океанѣ. *Биллингс*. Спина красная, бока синеватые, а брюхо желтоватое.

152. *Т. одноперый* (L. monopterygius, *Pall.*). Спинное плавательное перо одно во всю спину, хвостовое развиллистое; швовъ на обоихъ бокахъ по четыре: брюшный спереди раздвоенный. *Дл.* около $1\frac{1}{2}$ фуша.

С. 46. Г. 24. Б. 6. П. 24. X. 17.

Вод. въ Восточномъ морѣ. *Биллингс*. Спина оливковая, а бока желтоватые; сего ли рода?

153. *Т. осмилинный* (L. octogrammus, *Pall.*). Туловище ланцетовидное съ частыми темными кра-

пинками; спинныя перья почти срослися; швовъ или боковыхъ рубцовъ на бокахъ по чепыре. Дл. около 15 дюймовъ.

С. 19. Г. 19. Б. 7. П. 24. Х. 15.

Вод. въ Воспочномъ морѣ около Камчатки. Спина оливковаго цвѣту.

153. *Т. шестилинпый* (*L. hexagrammus, Pall.*). Спинныя перья опдѣльныя; шуловище чрезвычайно шероховатое, испещрено сребристыми крапинками; швовъ на бокахъ по три. Дл. 8 д.

С. $\frac{22}{21}$. Г. 17. Б. 6. П. 22. Х. 14.

Вод. въ Воспочномъ океанѣ около Камчатки.

Р. XXXVII. МРЕЖНИКЪ (*Spargus, L.*).

Туловище сжатое: ротъ маленькій со множествомъ острыхъ зубовъ, изъ числа копорыхъ задніе зубы круглые. Боковой рубецъ прерывается при концѣ спиннаго пера, а другой начинается и идетъ по бокамъ хвоста ().*

154. *М. зеленоватый* (*S. virescens, Pall.*). Изъ желта-зеленый, съ двумя темными пашнами при корнѣ хвостоваго пера. Дл. около 2 дюйм.

С. 22. Г. 13. Б. 6. П. 13. Х. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Южнаго берега Крымскаго. Въ плавательныхъ перьяхъ: спинныхъ, брюшныхъ и проходныхъ первая распорки колючія.

155. *М. сѣроватый* (*S. lividus, Pall.*). Сѣровато-сребристый, съ темною на бокахъ полоскою. Дл. $3\frac{1}{2}$ дюйм.

(*) *Мрежники* суть морскія рыбы очень красивыя; въ жаберной ихъ перепонкѣ по 5 распорокъ, спинное перо одно, хвостовое раздвоенное; шуловище покрыто большими чешуями.

С. 23. Г. 13. Б. 6. П. 11. X. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ.

156. *М. нѣжный* (*S. tenellus*, *Pall.*). *Спрый*, съ темною подъ глазами полоскою, двумя темными пятнами у хвостоваго пера и бѣлыми по шѣлу крапинами. *Дл.* около 2 дюйм.

С. 22. Г. . . Б. 6. П. 10. X. . . .

Вод. въ Черномъ морѣ. Впрочемъ и самъ *Палласъ*, описавшій сію породу, сомнѣвается, есть ли это особая порода, или только молодой сѣроватый *Мрежникъ*?

Р. XXXVIII. МАКРЕЛЬ (*Scomber*, *L.*).

Передняя часть сжатой головы вся или до половины безъ чешуй; боковой рубецъ на хвостѣ выпуклъ и острѣе, отъ чего хвостъ дѣлается углasiмымъ. На двухъ противоположныхъ сторонахъ хвоста отдѣльные пучки плавающихъ перьевъ (*).

157. *М. обыкновенная* (*S. Scomber*, *L.*; *Scomber glauciscus*, *Pall.*; *Die Makreele*; *Le Maquereau*). Плавающие спинныя перья отдѣльныя, на бокахъ хвоста сверху и снизу по пяти пучковъ плаваютъ перья; шуловище голубоватое съ черноватыми волнистыми поясами. *Дл.* 1 футъ (*Рис.* 33)

С. 11. Г. 19. Б. 5. П. 13. X. 20.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крымскихъ береговъ спадаетъ весною. Попадаетъ также и въ морѣ Балтійскомъ.

(*) *Макрели* суть морскія рыбы, у которыхъ голова острая; шуловище овальное; въ жаберной перепонкѣ 7 распорокъ; хвостъ жеспиной и хвостовое перо раздвоенное. Они водятся спадаетъ и ловятся для вкуснаго мяса.

158. *М. Понтійская* (*S. Ponticus*, *Pall.*). Пучковъ плават. перьевъ на хвостъ сверху 9, сѣисподи 8; первое спинное перо и жаберная перепонка съ черными полосками. Дл. около $1\frac{1}{2}$ фута.

С. $\frac{22}{14}$. Г. 25. Б. 6. П. 22. Х. . . .

Попадается изрѣдка въ Черномъ морѣ, большаго частію осенью.

159. *М. ящеричная* (*S. Lacerta*, *Pall.*); оплывается опъ другихъ боковымъ рубцемъ, который у нея покрытъ щитками и зазубренъ; пучки плават. перьевъ на хвостѣ слились вмѣстѣ: въ первомъ спинномъ перѣ 6 распорокъ; близъ порошицы двѣ колючки. Дл. около 5 дюйм.

Вод. около Крыма въ Черномъ морѣ.

160. *М. зубчатая - хвостая* (*S. Trachurus*. *L.*; *Der Stoecker*; *Le Maquereau batard*). Боковой рубецъ кривъ и колючъ; пучки плават. перьевъ на хвостѣ срослись въ одно перо; сзади порошицы двѣ колючки. Дл. около 6 дюймовъ.

С. $\frac{8}{34}$. Г. 20. Б. 6. П. 31. Х. 20.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

161. *М. сжатая* (*S. Syrticus*, *Pall.*). Туловище очень сжатое, пучковъ перьевъ на хвостѣ не примѣтно по причинѣ ихъ соединенія съ спиннымъ и проходнымъ перьями: перья брюшныя соединены какъ между собою, такъ и съ брюхомъ тонкою перепонкою. Дл. 7—8. дюйм.

С. $\frac{8}{24}$. Б. 14. Б. 6. П. 24. Х. 27.

Вод. въ Черномъ морѣ. Цвѣту сребристаго съ опливами.

Р. XXXIX. ГОЛОВАЧЬ (*Gobius L.*).

Голова толстая сжатая, или сплюснутая; распорокъ въ жаберной перепонкѣ 4—5; на спинѣ два

плавательныхъ пера; брюшныя перья срослись въ одно въ видъ воронки (*).

162. *Г. бызокъ* (*G. batrachosephalus*, *Pall.*) Голова сплюснутая сверху: нижняя челюсть шире верхней; шуловище и всѣ плавательныя перья песпрыя. Дл. 8 — 10 дюйм.

С. $\frac{6}{19}$. Г. 18—19. Б. 10. П. 16—17. Х. 15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Сверху желноватый съ разнообразными черпчками и полосками, съисподи сребристый.

163. *Г. чернорылый* (*G. melanostomus*, *Pall.*) желноватый, песпрый; голова черноватая; у перваго спиннаго пера черное луновидное пяшно: грудныя плавательныя перья сидятъ на мясистомъ основаніи. Дл. около 10 дюйм.

С. $\frac{6}{16}$. Г. 17. Б. 10. П. 14. Х. 15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. По темно-коричневому шуловищу черноватые пашна и полоски.

164. *Г. змѣголовый* (*G. ophioccephalus*, *Pall.*) Плавательныя перья всѣ представляють песпрыя съпщчки; на бокахъ шуловища едва примѣтны глазковыя пятна, а близь хвостоваго пера по одному глазку явспвенному. Дл. 5 д.

С. $\frac{12}{15}$. Г. 19. Б. 12. П. 15. Х. 15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма. Весь темнокоричневый съ темными пашнами, съисподи бѣлый.

(*) У всѣхъ *Головачей* шуловище сжатое, покрытое мѣлкими чешуйками; во рту мѣлкіе зубы; жаберныя крышечки приросли къ кожѣ. Рыбы сіи всѣ живутъ въ моряхъ, и одна только порода въ рѣкахъ. Мясо ихъ вкусное.

165. *Г. ширококрылый* (*G. platyrostris*, *Pall.*). Голова широкая плоская, шуловище темноватое, равно какъ и всѣ плавательныя перья: основаніе брюшнаго пера толстое, угластое съ двумя зубчиками. Дл. около 10 дюймовъ.

С. $\frac{6}{19}$. Г. 17. Б. . . . П. 13. Х. 14.

Вод. около Крыма въ Черномъ морѣ. Туловище темножелтоватое, съисподи бѣловатое.

166. *Г. толстоголовый* (*G. Cephalarges*, *Pall.*). Голова большая, толстая, рыло очень короткое; шуловище желтоватое; плавательныя перья всѣ темно-синія, а при основаніи бѣлыя; на глазахъ нижняго вѣка нѣтъ. Дл. около 8 д.

С. $\frac{6}{17}$. Г. 17. Б. 14. П. 13. Х. . . .

Вод. около Крыма въ Черномъ морѣ.

167. *Г. бѣловатый* (*G. Chilo*, *Pall.*). Голова большая: нижнее вѣко у глазъ бѣлое, прозрачное; шуловище темное, а плавательныя перья черноватыя. Дл. 7 дюймовъ.

С. 16. Г. 10. П. 13. Х. 15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

168. *Г. черный* (*G. Melanio*, *Pall.*). Весь черный, а съисподи синеватый; плавательныя перья черныя, спинныя и проходныя вѣшныя. Дл. около 9 дюймовъ.

С. $\frac{6}{14}$. Г. 18. Б. 12. П. 12. Х. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

169. *Г. зеленоватый* (*G. virescens*, *Pall.*) голова большая; шуловище темно-зеленое; плавательныя перья спинныя и проходное съ черными пятами. Дл. около 9 дюйм.

С. 16. Г. 18. Б. 12. П. 19. Х. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

170. *Г. мякоперый* (*G. quadricapillus*, *Pall.*). Первые чешыре распорки первого спинного пера оканчиваются мягкими ниями, а у второго пера распорки щетинистыя. Дл. 2 дюйм.

С. $\frac{4}{18}$. Г. 13. Б. 10. П. 16. X. 14.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма; спина черноватая, прочее шуловище темное.

171. *Г. пестрый* (*G. exanthematosus*, *Pall.*). Голова маленькая, уже шуловища; задній уголъ первого спинного плавательнаго пера черный; черныя выпуклыя крапины по всему шѣлу и перьямъ. Дл. $4\frac{1}{2}$ д.

С. $\frac{6}{16}$. Г. 17. Б. 10. П. 12. X. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма.

172. *Г. желтоватый* (*G. Sobitis*, *Pall.*). Голова маленькая, уже пестраго шуловища; подъ брюшнымъ перомъ четверосторонняя пленка; брюшныя перья съ желтоватыми поясками. Дл. 2 дюйм.

С. 14. Г. 15. Б. 10. П. 12. X. 17.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма; шуловище желтоватое, съ бѣлыми крапинками на чешуйкахъ.

173. *Г. крапинный* (*G. marmoratus*, *Pall.*). Голова маленькая, шуловище оливковаго цвѣту съ бѣлыми и темными черточками: на хвостъ близъ пера два бѣлыхъ пятна. Дл. 3 дюйм.

С. $\frac{6}{18}$. Г. 14. Б. 10. П. . . . X. . . .

174. *Г. рѣчный* (*G. fluviatilis*, *Pall.*; *G. niger*, *L.*; *Die Meergrundel*, *Le Gougeon*). Голова большая; шуловище пестрое, на корнѣ грудныхъ перьевъ черное пятно, во второмъ спинномъ перѣ 14 распорокъ. Дл. около 7 дюймовъ. (*Рис. 34*).

С. $\frac{6}{14-18}$. Г. 16—18. Б. 12. П. 14. X. 15.

Вод. въ устьяхъ большихъ рѣкъ, впадающихъ въ Черное и Каспійское моря, а также и въ дру-

гихъ рѣкахъ попадаетъ изрѣдка. Туловище желтоватое и темное. Всѣ корни плавательныхъ перьевъ кромѣ грудныхъ, темно - синіе.

175. *Г. головастый* (*G. macrocephalus*, *Pall.*). Голова приплюснутая, продолговатая: жаберныя крышечки зубчатые; на шлѣ бородавки въ 6 рядовъ. Дл. 5 дюйм.

С. $\frac{3}{9}$. Г. 16. Б. 10. П. . . Х. 13.

Вод. въ Каспійскомъ морѣ и въ устьяхъ рѣкъ въ него впадающихъ. Спина пепловидная, брюхо бѣлое.

П О Р Я Д О К ъ VI.

Р. БРЮХОПЕРЫЯ (*R. Abdominales*).

У сихъ рыбъ брюшныя перья находятся близъ грудныхъ на тазовыхъ костяхъ, а не на грудной кости.

А. Р. Б. м я г к о п е р ы я.

Р. XL. В Ъ Ю Н Ъ (*S o b i t i s*, *L.*).

Ротъ маленький, окруженный усиками; глаза на верхушкѣ головы; *туловище* продолговатое, кругловатое, одинакой ширины почти во всю длину, покрытое маленькими чешуйками и клейкостію. *Спинное перо* одно (*).

176. *В. Пискарь* (*S. Barbatula*, *L.*; *Der Schmerl*; *La Loche franche*). Голова безъ колючекъ у глазъ, сжатая: у рта шесть усиковъ, изъ коихъ на верхней

(*) Голова у *Вьюновъ* сжатая, безъ чешуекъ; губы толстыя, посредствомъ которыхъ они приспосабливаются къ шламъ; жаберныя крышечки внизу приросли къ кожѣ, а жаберная перепонка о 3 — 4 распоркахъ; туловище песчрое; порошица ближе къ хвосту. Рыбы сии живутъ въ рѣкахъ и озерахъ, и употребляются въ пищу.

губѣ 4, а по угламъ рта по одному усика. Дл. около 6 дюймовъ.

С. 9. Г. 12. Б. 9. П. 6. Х. 19—20.

Вод. въ чистыхъ рѣкахъ и рѣчкахъ по всему почти Государству. Цвѣтъ пестрый, сѣрый съ бѣлымъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ зовутъ его и *Столбцомъ*.

177. *В. Подкаменщикъ* (С. Taenia, L.; Der Steinspitzger; La Roche de riviere). Два усика сидятъ на верхней губѣ и 4 на нижней; *подъ каждымъ глазомъ* находится по подвижной раздвоенной колюжкѣ. Дл. около 5 дюймовъ.

С. 10. Г. 11. Б. 7. П. 10. Х. 17.

Вод. въ рѣкахъ текущихъ по камнямъ, между горъ, въ Сибири, около Урала и Кавказа. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи называютъ его *Мулавою* и *Маллавою*. Спина темная, бока желтые, съ темными пятнами.

178. *В. обыкновенный* (С. fossilis, L.; Der Schlammbeißer; La Roche d'étang). Усиковъ 10, изъ числа которыхъ 6 на верхней губѣ, а 4 на нижней; *надъ глазами по колюжкѣ*. Дл. около 12 дюйм. (Рис. 35).

С. 7. Г. 11. Б. 8. Пр. 8. Х. 14.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ по всей почти Россіи. Туловище темное, съ желтыми полосами: брюхо желтое.

Р. ХІІ. К А Р П І Я (Cyprinus, L.).

Ротъ маленькій безъ зубовъ; губы выпускныя; *въ жаберной перепонкѣ три распорки*; спинное плавательное перо одно (*).

(*) Рыбы сего рода, одного изъ многочислѣннѣйшихъ породъ, и извѣстный въ Россіи подъ разными именами, живутъ большею частію

А. *Карпiя* (*Cyprinus*, *Cuv.*) съ усиками у рта.

179. *К. обыкновенная* (*C. Carpio*, *L.*; *Der Karpfe*; *Le Carpe vulgaire.*). Усовъ у рта 4; *вторая распорка у спиннаго плавательнаго пера и у проходнаго еъ зубчиками*: въ проходномъ перѣ 9 распорокъ. Дл. отъ 1 до 2 фут. (*Рис. 36*).

С. 21. Г. 16. Б. 9. П. 9. Х. 19.

Вод. въ Каспійскомъ, Черномъ и Азовскомъ моряхъ и во всѣхъ большихъ рѣкахъ. Въ Сибири нѣтъ, но опять появляется въ рѣкахъ Даурскихъ. Въ Малороссiи называютъ его *Коропомъ*; а около Волги и Урала *Сазаномъ*. Онъ покрытъ большими чешуями, сверху зеленоватъ или желтоватъ; бока желтоватые или черноватые, а брюхо бѣловатое.

180. *К. Усачъ* (*C. Barbus*, *L.*; *Der gemeine Barbe*; *Le Barbeau*). Туловище длинное, кругловатое, усиковъ 4; *верхняя челюсть гораздо длиннѣе нижней*; въ спинномъ перѣ 10 распорокъ, изъ коихъ первая зазубренная съ обѣихъ сторонъ, въ проходномъ 8 распорокъ. Дл. $1\frac{1}{2}$ фута.

С. 12. Г. 17. Б. 9. П. 8. Х. 19.

Вод. въ Каспійскомъ и Черномъ моряхъ и въ рѣкахъ, въ оныя впадающихъ. Спина оливковая, бока синеватые, а брюхо бѣлое. — Въ Бѣлороссiи называютъ ее *Мирономъ*, около Днѣпра и Днѣстра *Мареною*, или *Марною*, а около Каспійскаго моря *Усачемъ*. Въ Крыму попадаются Усачи маленькіе, не больше 12 дюймовъ, зеленоватые, съ темными на бокахъ крапинами, а въ Грузiи бѣловатые, у коихъ одна только спина темная.

въ прѣсныхъ водахъ, хотя много ихъ водится и въ моряхъ. Онъ менѣе всѣхъ другихъ хищны, ибо питаются по большей части травою, червями и насекомыми, и всегда почти живутъ общесствомъ. Мясо многихъ изъ нихъ очень вкусно.

181. *К. Булатмай* (*C. chalybatus*, *Pall.*; *C. Bulatmai*, *Lin.-Gm.*). Весьма похожъ на *Усача*, но у *Булат-мая* вторая распорка спиннаго пера зубчатая, и въ проходномъ перѣ 7 распорокъ. Дл. около 3 ф.

С. 10. Г. 19. Б. 9. П. 8. X. 21.

Вод. въ Каспійскомъ морѣ.

182. *К. Мурза* (*C. mystaceus*, *Pall.*; *C. Mursa*, *Lin.—Gm.*). Также очень похожъ на *Усача*, и опличается опъ него первою распоркою спиннаго пера, при корнѣ только зубчатою. Дл. около 13 дюйм.

С. 11—12. Г. 16—17. Б. 8. П. 7. X. 19.

Вод. въ Грузіи въ рѣкѣ Курѣ.

183. *К. желтая* (*C. Capito*, *Güldenst.*). Опъ *Усача* опличается только постоянно желтымъ цвѣтомъ брюха. Дл. около 16 дюймовъ.

Вод. въ Грузіи въ рѣкѣ Курѣ. Чешуи довольно большія (*).

184. *К. Пищуль* (*C. Fundulus*, *Pall.*; *C. Capota*, *Güldenst.*). Усовъ два; распорка на спинномъ перѣ съ обѣихъ споронъ зазубренная. Дл. около 12 дюйм.

С. 12—13. Г. 17—19. Б. 9—10. П. 9. X. 19.

Вод. въ рѣкѣ Курѣ, куда поднимается зимою изъ Каспійскаго моря. Спина темно-зеленоватая, съ черными почками, а брюхо бѣлое.

185. *К. Пискарь* (*C. Gobio*, *L.*; *Der Gründling*; *Le Goujon*). У каждаго угла рта по одному усу; пуловище продолговатое, кругловатое; плавающие перья въ пяпнахъ. Дл. около 12 дюйм.

С. 11. Г. 16. Б. 9. П. 10. X. 19.

(*) *Усачъ*, *Булатмай*, *желтая* и *Мурза*, можетъ быть, составляютъ одну породу, ибо различіе между ними не очень примѣтное.

Вод. въ рѣкахъ и рѣчкахъ по всей Россіи. Спина темно-зеленоватая или синеватая, а бока сребристо-желтоватые съ пятнами. Въ большей части Россіи называется *Пискарь* и *Пескозобъ*, въ Новгородской Губерніи *Мулятка*; въ Малой Россіи *Столбецъ*.

186. *Линъ* (С. Tinca, L.; Die Schleie; La Tanche). На обоихъ углахъ рта по маленькому усику; *туловище* овальное, *клейкое*, *чешуйки мѣлкія*; *плавательныя перья* толстыя, въ проходномъ перѣ 11 *распорокъ*. *Дл.* отъ 1 до 2 футовъ.

С. 12. Г. 18. Б. 11. П. 11. Х. 19.

Вод. въ озерахъ и рѣкахъ, тихо текущихъ и мутныхъ, по всей Россіи и Сибири. Спина темная и темно-зеленая, бока желтые или желтоватые, а брюхо бѣлое. Цвѣтъ измѣняется по чистотѣ воды.

Б. *К. безъ усовъ, хвостовое перо цѣльное.*

187. *К. Карась* (С. Carassius, L.; Die Karausche; Le Carassin). *Туловище широкое, овальное*; *хвостовое перо цѣльное*, а въ *проходномъ* 16 *распорокъ*. *Дл.* отъ 10 до 12 дюймовъ.

С. 21. Г. 13. Б. 9. П. 10. Х. 21.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ по всему Государству. Сверху зеленоватъ; бока желтоватые, а исподъ бѣловатъ; но есть Караси и бѣловатые. Разводятся вездѣ въ прудахъ.

188. *К. красноватая* (С. Gibelio, Bloch.). *Туловище широкое, покрытое большими чешуями*; боковой *рубецъ загнулся внизъ*; въ *спинномъ перѣ* 19 *распорокъ*, *хвостовое луновидное*. *Дл.* отъ 8 дюймовъ до 1 фута.

С. 19. Г. 15. Б. 9. П. 8. Х. 20.

Вод. въ озерахъ Гродненской и Виленской Губерніи, по свидѣтельству *Ейхвалда*,

189. *К. Вырпзубъ* (С. *Cephalus*, *L.*). Туловище покрыто большими чешуйками, и почти цилиндрическое; въ плавательныхъ перьяхъ: спинномъ и проходномъ по 11 распорокъ. Дл. 1—2 фута.

С. 11. Г. 8. Б. 10. П. 11—12. Х. 19.

Вод. въ рѣкахъ, впадающихъ въ Черное и Каспійское моря; хвостовое перо почти цѣльное, темное.

В. Безъ усомъ: хвостовое перо раздвоенное.

190. *К. Мунда* (С. *Pegonurus*, *Pall.*). Чешуйки на тѣлѣ маленькія; спинное перо о 8 распоркахъ, темное, брюшное, грудное и проходное красныя. Дл. около 5 дюйм.

С. 8. Г. 9. Б. 7. П. 9. Х. 20.

Вод. по озерамъ и другимъ стоячимъ водамъ около Р. Лены въ Сибири. Спина зеленоватая, а брюхо сребристое.

191. *К. Голова* (С. *Orfus*, *L.*; *Die Orfe*; *L'Orfe*). Туловище плоское, широкое, желтоватое или красноватое; плавательныя перья все красныя: проходное о 13—14 распоркахъ. Дл. около 1½ ф.

С. 10. Г. 11. Б. 10. П. 14. Х. 22.

Вод. въ Донѣ, рѣкахъ Кавказа и другихъ Южной Россіи.

192. *К. Голубель* (С. *Dobula*, *L.*; *Der Döbel*; *L'Able meunier* ou *Dobule*). Голова толстая; туловище продолговатое, кругловатое, покрытое крупными чешуями; въ спинномъ и проходномъ перѣ 10 распорокъ: перья брюшныя и проходное красныя. Дл. около 12 д.

С. 11. Г. 15. Б. 9. П. 11. Х. 18.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ по всей почти Россіи. Спина зеленоватая или темно-желтоватая, а

брюхо серебристо-синевашое. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называется *Головлемъ* и *Головнемъ*.

193. *К. Подустъ* (С. Nasus. L.; Die Nase; Le Nase). Верхняя челюсть тупая, и выдалась надъ нижнею въ видъ носа; въ проходномъ перѣ 10—15 распорокъ. Дл. 12 дюймовъ и болѣе.

С. 12. Г. 16. Б. 13. П. 15. Х. 22.

Вод. въ Юговосточной части Россіи въ рѣкахъ. Спина темная, брюхо серебристое.

194. *К. Конъ* (С. Labeo, Pall.). Ротъ сжисподи рыла, луновидный, верхняя челюсть тупая и выдалась надъ нижнею; чешуи на тѣлѣ крупныя: въ проходномъ перѣ 17 распорокъ. Дл. около 2 фушовъ.

С. 8. Г. 19. Б. 9. П. 7. Х.

Вод. въ Ленѣ, Ковымъ и рѣкахъ Даурскихъ, впадающихъ въ Амуръ. Спина синевашая, бока серебристые, а брюхо бѣлое.

195. *К. носастая* (С. rostratus, Tilesii). Чешуи на тѣлѣ мѣлки; у брюшныхъ плавательныхъ перьевъ первая распорка костяная острая, въ проходномъ перѣ 7 распорокъ. Дл. 12 дюйм. и болѣе.

С. 10—12. Г. 14. Б. 10. П. 7. Х. . Д. 0.

Вод. въ Р. Ленѣ, Ковымъ, Индигиркѣ и другихъ смежныхъ. Спина темносиняя, бока серебристые. Очень вкусная рыба.

196. *К. Шересперъ* (С. garax, Pall.; С. Aspius, L.; Der Raarpe; La Raphe). Туловище овальное, нѣсколько сжатое, покрытое крупными чешуями; нижняя челюсть длиннѣе верхней и нѣсколько загнута вверхъ; проходное перо съ выемкою 0 15 — 16 распоркахъ. Дл. около 1½ фуша.

С. 11. Г. 20. Б. 9. П. 16. Х. 20.

Вод. въ рѣкахъ по всей почти Южной и Умѣренной части Россіи. Спина сребристо-темная, а бока побѣлѣе. Рыба сія называется и *Шерехомъ*, въ Малой Россіи *Белестомъ* и *Бѣлезнею*, около Камы *Конемъ*, въ С.-Петербургѣ *Бѣлою* рыбою.

197. *К. Красноперъ* (*G. leptocerphalus*, *Pall.*). Рыло длинное плоское, нижняя челюсть длиннѣе верхней; чешуи на шѣлѣ мѣлкія; плаващельныя перья всѣ, выключая спинное, красныя: въ проходномъ перѣго распорокъ. *Дл.* $1\frac{1}{2}$ фуша.

С. 8. Г. 20. Б. 10. П. 8. X. 19.

Вод. въ Дауріи въ рѣкахъ Ингодѣ и Ононѣ. Спина синеващая, бока сребристыя.

198. *К. Чебакъ* (*C. lacustris*, *Pall.*). Рыло тупое, нижняя челюсть короче верхней; на шѣлѣ чешуи крупныя; всѣ плаващельныя перья темно-красныя: въ спинномъ и проходномъ перьяхъ по 11 распорокъ. *Дл.* 12 дюйм.

С. 10—11. Г. 18. Б. 9. П. 11—12. X. 19.

Вод. въ озерахъ и рѣкахъ всей Сѣверной части Россіи и въ Сибири. Спина темновашая, а бока сребристыя; въ С. Петербургѣ называется *Сирромъ* или *Сиртомъ*.

199. *К. Язь* (*C. Idus*, *L*; *Der Kähling*; *L'Idé*). Голова и шѣло толстыя; плаващельныя перья и чешуи крупныя; перья красныя, а особливо *проходное* перо *очень красное* и о 13 распоркахъ. *Дл.* отъ 1 до 3 ф.

С. 9—10. Г. 17—18. Б. 9—10. П. 13—14. X. 19.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ всей Имперіи. Спина темная или зеленоващая, бока бѣловашыя. Въ С.-Петербургѣ называется *Русскимъ Карпомъ*, а маленькія *Подъязыками*.

200. *К. Сорога* (*C. rutilus*, *L*; *Das Rothauge*, *La Rore*). Туловище сжатое и въ длину противъ ши-

рины строе больше; плавательныя перья всѣ красныя, въ проходномъ перѣ 14 распорокъ. Дл. 12 д.

С. 13. Г. 15. Б. 9. П. 14. Х. 20.

Вод. въ рѣкахъ всей Россіи и Сибири. Спина зеленовато - темная, а иногда и синеватая; чешуи на тѣлѣ крупныя. Въ разныхъ мѣстахъ Россіи называется и *Плотвою*, *Голавлемъ*, *Красноперкою*.

201. *К. Плотва* (С. Erythrops, Pall.; С. Erythrophthalmus, L.; Die Plötze). Туловище плоское, покрытое крупными чешуями; плавательныя перья, особливо нижнія, очень красныя, въ *проходномъ перѣ* 15 *распорокъ*; глаза красныя. Дл. около 12 д.

С. 12. Г. 16. Б. 10. П. 15. Х. 20.

Вод. во всѣхъ рѣкахъ и озерахъ по всему Государству. Спина сверху зеленоватая, бока желтоватые.

202. *К. зеленоватая* (С. chrysoprasius, Pall.). Туловище плоское съ мѣлкими чешуйками; спина синеватая или желтоватая съ полоскою на обоихъ бокахъ синеватою или золотистою; у плавательныхъ перьевъ корни желтоватые; *крышечки жаберныя* о 4 *листочкахъ*. Дл. около 6 дюйм.

С. 10. Г. 14. Б. 7. П. 23. Х. 19.

Вод. въ рѣчкахъ гористой части Крыма.

203. *К. Уклея* (С. Leuciscus, L.; Der Lauben; La Vauchoise). Туловище продолговатое, покрытое чешуйками не очень большими; перья сѣрыя: въ *спинномъ перѣ* 10, а въ *проходномъ* 10—11 *распорокъ*. Дл. отъ 6 до 12 дюймовъ.

С. 10. Г. 15. Б. 9. П. 10—11. Х. 18.

Вод. по рѣкамъ всего почти Государства. Спина темно-оливковая, а бока и брюхо серебристыя; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называется *Ельцемъ*.

204. *К. Вобла* (*C. Grislagine, L.*). Чешуи на тѣлѣ крупныя; плавательныя перья при корнѣ красно-ватые, а на концѣ черныя: въ спинномъ и проходномъ перьяхъ по 11 распорокъ. Дл. около 1. фут.

С. 11. Г. 19. Б. 9. П. 11. Х. 18.

Вод. въ Каспійскомъ морѣ, откуда въ Февралѣ и Маршѣ поднимается въ Волгу и другія рѣки. Спина темная, бока серебристые. *Палласъ* полагаетъ, что Вобла, можешь быть, есть только выродокъ *Голубеля*.

205. *К. Момса* (*C. sericeus, Pall.; C. amarus, Bloch.; Der Bitterling; La Geteuse*). Туловище широкое плоское, полупрозрачное; плавательныя перья всѣ красныя: перья грудныя и брюшныя о 7 распоркахъ. Дл. два дюйма.

С. 10. Г. 7. Б. 7. П. 11. Х. 20.

Вод. въ рѣкахъ Даурскихъ, гдѣ и называется *Плотвою*. Живая рыбка фіолетово-серебристая и только на спинѣ примѣчается темный цвѣтъ. *Палласъ*. Она меньше всѣхъ рыбъ сего рода.

206. *Селля* (*C. Alburnus, L.; Der Ukeley; L'Ablette*). Туловище плоское ланцетовидное съ тонкими чешуями, легко опшшающими. Въ проходномъ перѣ 20 распорокъ; нижняя челюсть длиннѣе верхней. Дл. около 8 дюйм.

С. 10. Г. 15. Б. 9. П. 20—21. Х. 19.

Вод. въ рѣкахъ всей почти Россіи. Спина темно-оливковая или синеватая, а бока серебристые. Изъ чешуекъ приуготовляется матерія для подкладки бусъ. Въ Новгород. Губерніи она называется *Уклеюю*, на Окѣ *Сиклою* и *Верховодкою*; въ Малороссіи *Себелемъ*, а большія *Селедкою*; около Урала *Конюхомъ*, *Гармакомъ*; около Камы *Вандышемъ* и *Шеклейкою*.

207. *К. Тарань* (*C. Vimba*, *L.*; *Die Zärthe*, *La Ser-te*). Туловище широкое, ялицевидное, покрытое крупными чешуями; *верхняя челюсть* мясиспая и *выдалась въ видъ носа надъ нижнею*; въ проходномъ перѣ 24 распорки. *Дл.* около 13 дюймовъ.

С. 12. *Г.* 17. *Б.* 11. *П.* 24. *Х.* 19.

Вод. въ Каспійскомъ, Азовскомъ и Черномъ моряхъ, откуда осенью поднимается въ чрезвычайномъ множествѣ въ Волгу и Донъ. Спина темная; бока серебристые. Ее называютъ около Урала *Густерою*, около верхней части Волги *Селявою*, около Ладоги *Сиртемъ*, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ *Щеберкою*.

208. *К. Рыбецъ* (*C. carinatus*, *Pall.*). Отличается отъ всѣхъ прочихъ породъ *очень острою спиною*, начиная отъ головы до самого хвоста; туловище широкое; въ проходномъ перѣ 24 распорки. *Дл.* 13 д.

С. 12. *Г.* 11. *Б.* 10. *П.* 24. *Х.* 19.

Вод. въ заливахъ Азовскаго моря и въ рѣкѣ Дону. Перья грудныя и брюшныя красныя, а корень бѣловатый, у прочихъ же перьевъ верхъ темный.

209. *К. Калинка* (*C. gibbosus*, *Pall.*). Чешуйки на пѣлѣ не очень крупныя, спина оспрая и очень выдававшаяся близь спиннаго пера; *проходное перо темное*, о 22 распоркахъ. *Дл.* около 6 дюйм.

С. 10. *Г.* 16. *Б.* 9. *П.* 22. *Х.* 19.

Вод. въ рѣкѣ Волгѣ и Сурѣ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называется *Уклею*. *Паласъ*. Спина темная съ опшѣнкою зелени.

210. *К. Лещъ* (*C. Brama*, *L.*; *Der gemeine Brachs*; *La Breme*). Туловище овальное, широкое, покрытое крупными чешуями; *плавательныя перья черныя*; въ проходномъ перѣ 27 — 29 распорокъ. *Дл.* отъ 1 ф. до 4.

С. 10—12. Г. 15—18. Б. 9—10. П. 27—29. X. 19.

Вод. во всѣхъ большихъ рѣкахъ и озерахъ всей Россіи; около Дона называется *Чебакомъ*, а маленькіе *Подлещиками*, *Полу-чебаками*; спина зеленоватожелтоватая, бока желтые, а брюхо бѣлое.

211. *К. Ласкиръ*, (С. Laskyr, Pall.). Чешуи на тѣлѣ крупныя; въ *проходномъ перѣ* около 40 *распорокъ*. Дл. около 10 д.

С. 11. Г. 16. Б. 9. П. 27—30.

Вод. въ Дону, Сеймѣ и другихъ рѣкахъ Малороссіи. *Гильденштедтъ*. Въ Воронежской Губерніи называется *Круглякомъ* и *Густерою*.

212. *К. Синтепа* (С. Ballerus, L.; Die Zope; La Sore). Туловище широкое; въ *проходномъ перѣ* 41 *распорка*. Дл. около 12 д.

С. 10. Г. 16—17. Б. 9. П. 41. X. 19.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ по всей почти Россіи, но въ Сибири нѣшъ. Спина темная, бока желтоватые или красноватые, а брюхо красноватое (не у всѣхъ). У проходныхъ перьевъ корни покрыты чешуйками. Въ Малороссіи называютъ ее *Синецъ* и *Синга*.

213. *К. Синецъ* (С. Blicca, L.). Туловище широкое, *спина выгнутая*, верхняя челюсть *длиннѣе нижней*; боковой рубецъ загнулся внизъ; проходное плавательное перо длинное. Дл. $8\frac{1}{2}$ д.

С. 12. Г. 15. Б. 10. П. 25. X. 22.

Вод. въ Каспійскомъ морѣ и рѣкахъ въ него впадающихъ? *Эйхвалдъ*.

214. *К. Сапа* (С. Sapa, Pall.). Туловище широкое, покрытое крупными чешуями; рыло выдававшееся, шупое, *ротъ выпускной*, въ *проходномъ перѣ* 40 *распорокъ*. Дл. 12 д. и болѣе.

С. 9. Г. 16—19. Б. 9. П. 40. X. 19.

Вод. въ Волгѣ и рѣкахъ въ нее впадающихъ, какъ по: въ Сурѣ, Самарѣ, Капели и проч. Около Самары называется *Лобатемъ*, а въ Казани *Синцомъ*. Спина синеватая, а бока сребристые. Спинное перо острое.

215. *К. Клевещъ* (*C. Cleveza, Pall.; an C. Fagenus, L?*). Туловище ланцетовидное, плоское, покрытое крупными чешуями; въ проходномъ перѣ 40 распорокъ. Дл. около 12 д.

С. 11. Г. 17. Б. 9. П. 40—45. Х. 19.

Вод. въ устьѣ рѣки Дона. *Гилдеништедтъ*. Клевещъ, можетъ быть, есть только выродокъ *Синтепы*. Его называютъ и *Пугеглазикомъ*.

216. *К. Мулавка* (*C. Phoxinus, L.; C. rivularis, Pall.; C. Golian, Lerech. Die Ellritze; Le Veron*). Туловище кругловатое, покрытое мѣлкими чешуйками; въ спинномъ перѣ 4, въ брюшномъ по 8—10, а въ проходномъ 7—8 распорокъ. Дл. 3 дюйма.

С. 8—10. Г. 14—17. Б. 8—10. П. 7—8. Х. 19—20.

Вод. въ быспрыхъ горныхъ рѣчкахъ Уральскихъ, Алтайскихъ и Саянскихъ. За Ураломъ называютъ ее *Голіаномъ* и *Салдатомъ*. Тѣло ея полупрозрачное, синеватое, черноватое или желшоватое, но всегда въ пятнахъ, а брюхо красноватое. Молодыя черноваты и даже совсѣмъ черного цвѣту.

217. *К. Чехонъ* (*C. cultratus, L.; Die Ziege; Le Rasoir*). Спина прямая, а брюхо острое выгнутое, боковой рубецъ изгибистый; въ проходномъ перѣ 29—30 распорокъ. Дл. $1\frac{1}{2}$ фута.

С. 8—9. Г. 15—17. Б. 8—9. П. 29—32. Х. 19.

Вод. по большимъ рѣкамъ и озерамъ всего почти Государства. Называется *Сабля-рыба* и *Чеша*, а въ Малой Россіи *Боковня*. Грудныя перья очень длинны.

218. *К. Скабрия* (*C. clupeoides*, *Pall.*; *C. Chalcoides*, *Güldenst.*). Похожа на Чехонь, но брюхо у ней не споль выгибистое и близъ брюшныхъ перьевъ острое; боковой рубецъ идетъ почти по брюху; въ проходномъ перѣ 18 распорокъ. Дл. 12 дюйм.

С. 8—12. Г. 15. Б. 9. П. 15—20. Х. 19.

Вод. въ Каспійскомъ морѣ, Азовскомъ и Черномъ, откуда осенью поднимается въ Терекъ и Куру, Донъ, Днѣпръ и Днѣстръ. Спина зеленоватая, бока серебристые. Очень жирная рыба, почему около Терека и извѣстна подъ симъ именемъ, а около Азовскаго моря подъ именемъ *Селявы*. Копченая развозишся подъ именемъ *Шаман*.

219. *К. Тариши* (*C. Tarichi*, *Güldenst.*). Длина тѣла превышаетъ ширину въ 7 разъ; боковой рубецъ закривленъ къ низу и идетъ близъ брюха; спина прямая; въ проходномъ перѣ 14 распорокъ. Дл. около 10 дюйм.

С. 11—12. Г. 15—17. Б. 9—10. П. 14—15. Х. 19.

Вод. Армянской обласпи въ озерѣ Гогъ. *Гилденштедтъ*. Спина синеватая, бока серебристые съ темными крапинками.

Р. XLII. С Е Л Ъ Д Ъ (*Clupea*, *L.*).

Туловище сжатое: *брюхо* острое *зазубренное*; на *спинь* плавательное перо одно: *хвостое* развилистое (*).

(*) У *Сельдей* голова и тѣло сжатое, жабра вверху щепишныя, жаберныя крышки о 3 или 4 листочкахъ, а перепонка жаберная о 3 распоркахъ. Сельди водятся въ моряхъ въ безчисленномъ количествѣ, и доставляютъ изобильную пищу какъ морскимъ животнымъ, такъ и людямъ.

220. *С. Желъзница* (С. Piltshardus, Pall.). Челюсти почти одинакой длины; въ спинномъ перѣ 16 распорокъ; спина синевапая, а бока сребрисшыя (безъ пашень) (*). Дл. отъ 8 до 13 дюйм.

С. 18. Г. 17. Б. 8. П. 12. Х. 22.

Вод. въ Черномъ, Азовскомъ и Каспійскомъ моряхъ, откуда лѣтомъ большими стадами заходитъ въ рѣки, въ нихъ впадающія. По Волгѣ называется *Бышеною* рыбою.

221. *С. обыкновенная* (С. Harengus, L.; Der Hering; Le Hareng). Нижняя челюсть длиннѣ верхней: въ спинномъ плавапелльномъ перѣ 17 распорокъ; на брюхѣ зубчики почти не примѣшны. Дл. около 12 дюймовъ. (Рис. 37).

С. 18. Г. 10. Б. 9. П. 7. Х. 18.

Вод. въ Сѣверномъ и Восточномъ океанахъ, а также въ Бѣломъ морѣ и Охотскомъ заливѣ. Въ пищу употребляется наиболѣе соленая.

222. *С. Салакушка* (S. Encrasicolus, L.; Der Anjovis; L'Anchois). Верхняя челюсть гораздо длиннѣ нижней, коническая; брюхо съ зубчиками почти не примѣшными. Дл. около 5 дюймовъ.

С. 14. Г. 15. Б. 7. П. 18. Х. 18.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крымскихъ береговъ въ чрезвычайномъ множествѣ, гдѣ и называютъ ее *Бѣлою Рыбкою*. Спина синевапая, а прочее тѣло сребристое.

223. *С. маленькая* (С. Sprattus, L.; Der Breitling; La Sardine). Нижняя челюсть длиннѣ верхней; въ спинномъ плавательномъ перѣ 15 распорокъ, а въ проходномъ 19. Дл. около 5 дюймовъ.

(*) *Clupea Alosa*. L. Весьма похожа на сію рыбу, только съ пашнями вдоль спины. — Русскіе Испытатели Природы считали С. Piltshardum, за С. Alosa, о которой еще не совершенно извѣстно, есть ли она въ Россіи.

С. 17. Г. 16. Б. 6. П. 19. X. 18.

Вод. въ большомъ количествѣ въ Балтійскомъ морѣ, около Ревеля и въ Балтійскомъ портѣ. Плавапельныя перья пепельныя.

Р. XLIII. ГОБЗИКЪ (*Atherina*, L.).

Туловище продолговатое; *губы* выпускныя: зубы во рту очень мѣлкіе; въ жаберной перепонкѣ 5 распорокъ; на спинѣ два пера отдѣльных (*).

224. *Г. бѣловатая* (*A. Nerpsetus*, L.; *Mugil Atherina*, *Pall.*). На бокахъ по полосѣ яркаго серебристаго цвѣту; во второмъ спинномъ перѣ 9 распорокъ. Дл. $5\frac{1}{2}$ дюймовъ. (*Рис.* 38).

С. $\frac{9}{9}$. Г. 15. Б. 6. П. 12. X. 12.

Вод. въ Черномъ морѣ. Туловище полупрозрачное.

Р. XLIV. СЕМГА (*Salmo*, L.).

Опличительный признакъ сего рода состоятъ въ *второмъ спинномъ перѣ*, въ которомъ нѣтъ костяныхъ или хрящеватыхъ распорокъ, но *одинъ только жиръ, покрытый кожей* (**).

(*) *Гобзики* суть морскія рыбы, близко подходящія къ Головамъ, у которыхъ туловище нѣсколько сжатое и покрытое мѣлкими чешуями, жаберныя крышечки съ шипами колючками, хвостовое перо раздвоенное.

(**) *Семга* составляетъ весьма многочисленный родъ рыбъ, легко узнаваемыхъ по маленькому жирному перу, на спинѣ близъ хвоста находящемуся. У всѣхъ породъ сего рода голова гладкая оспоровавшая, во рту число зубовъ различное, туловище ланцетовидное, въ жаберной перепонкѣ отъ 4 до 12 распорокъ, жаберная крышка состоитъ изъ трехъ косточекъ. Всѣ породы живутъ въ моряхъ, откуда многія изъ нихъ заходятъ въ рѣки и озера; всѣ онѣ доставляютъ вкусную пищу.

А. СЕМГИ (Truttae), у которыхъ весь ротъ усаженъ зубами, не только челюстями, но небо, языкъ и горло. Туловище болѣею частію пестрое (въ пятахъ).

225. *С. обыкновенная* (S. Salar, L.; S. nobilis, Pall.; Der Lachs; Le Saumon). Верхняя челюсть длиннѣе нижней; хвостовое перо луновидное; *туловище сребристое, съ черными пятнами*; въ проходномъ перѣ 13 распорокъ. Дл. отъ 3 до 6 футовъ.

С. 14. Г. 14. Б. 10. П. 15. Х. 21.

Вод. въ Балтійскомъ, Сѣверномъ и Бѣломъ моряхъ въ большомъ количествѣ, а въ Черномъ и Каспійскомъ въ меньшемъ; изъ морей поднимается въ рѣки, въ нихъ впадающія. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ называютъ его *Лососемъ*, а мясо *Лососиною*.

226. *С. Лохъ* (S. Eriox, L.; S. Spurius, Pall.). *Туловище темное, съ сѣрыми пятнами*; хвостовое перо почти луновидное: въ плавательныхъ перьяхъ спинномъ и проходномъ по 12 распорокъ. Дл. $2\frac{1}{2}$ футовъ и болѣе.

С. 12. Г. 12. Б. 8. П. 12. Х. 19.

Вод. въ рѣкахъ, впадающихъ въ моря, особливо въ Балтійское и Каспійское.

227. *С. Лосось* (S. Hucho. L.; Der Nauch). *Туловище и все плавательныя перья, выключая грудныя, испещрены круглыми черноватыми пятнами*. Дл. около $2\frac{1}{2}$ футовъ.

С. 13. Г. 17. Б. 10. П. 12. Х. 18.

Вод. въ рѣкахъ, впадающихъ въ Балтійское море, въ Волгѣ, Камѣ и другихъ Сѣверныхъ. Мясо сей рыбы красное. Около Камы называютъ ее *Стрежневымъ Линемъ* и *Красною рыбою*.

228. *С. Лавраки* (S. Labrax, Pall.). *Туловище сребристаго цвѣту безъ пятенъ, рыло коническое,*

хвостовое перо почти ровное, проходное перо о 9 распоркахъ, а спинное въ пяпнахъ. *Дл.* $1\frac{1}{2}$ фуша.

Вод. въ Черномъ морѣ у береговъ Крымскихъ и Очаковскихъ. Мясо красноватое, очень вкусное.

229. *С. Грошица* (*S. Trutta, L.; Die Lachs-Forelle; La Forelle Saumon*). Верхняя челюсть длиннѣ нижней; *все туловище испещрено глазковыми пятнами черными и красными*; спинное плавательное перо обѣ 11 распоркахъ и съ черными пяпнами; хвостовое луновидное. *Дл.* около $\frac{3}{4}$ аршина.

С. 14. *Г.* 14. *Б.* 10. *П.* 11. *Х.* 20.

Вод. у Южнаго берега Крыма въ Черномъ морѣ, откуда заходитъ и въ рѣки. Вкусная рыба.

230. *С. Форель* (*S. Fario, L.; Die Wald-Forelle; La Truite brune*). *Вся испещрена черными и красными пятнами*; нижняя челюсть нѣсколько длиннѣ верхней; спинное перо о 15 распоркахъ, съ красными пяпнами: хвостовое перо почти ровное, а проходное обѣ 11 распоркахъ. *Дл.* около 1 фуша. (*Рис.* 39).

С. 14. *Г.* 10. *Б.* 13. *П.* 11. *Х.* 18.

Вод. во всѣхъ рѣкахъ, текущихъ по чистому хрящеватому дну между горъ въ Сѣверной части Россіи, въ Кавказской обласпи и въ Крыму. Въ Сибири ее нѣтъ. Мясо очень вкусное. Ее называютъ въ разныхъ мѣстахъ *Пеструшкою* и *Грошицею*.

231. *С. красная* (*S. Erythraeus, Pall.; L. S. Erythrinus, Georgi.; S. Alpinus, L.; Die Alpforelle; La Truite des Alpes*). Нижняя челюсть нѣсколько длиннѣ верхней; *туловище съ красными пятнами*, съисподи красноватое; плавательныя перья красныя: спинное о 12 распоркахъ, съ пяпнами, хвостовое немного раздвоенное. *Дл.* около $1\frac{1}{2}$ фуша.

С. 13. *Г.* 14. *Б.* 8. *П.* 12. *Х.* 13.

Вод. въ Горномъ Сибирскомъ озерѣ Фрелихъ, имѣющемъ сообщеніе съ Вѣсточною частію Байкала; находится также въ озерѣ Миджиръ между Саянскими горами, и въ Лапландіи.

252. *С. Курильская* (*S. Curilus*, *Pall.*). Туловище сверху черноватое, бока темнооливковые, съ бурыми и бланжевыми пятнами; нижняя челюсть длиннѣе верхней; спинное плаващельное перо обѣ 11 распоркахъ, хвостовое нѣсколько раздвоено. Дл. 7 дюйм. 8 лин.

Вод. въ рѣчкахъ Курильскихъ острововъ. *Меркѣ.*

253. *С. Малма* (*S. Callarias*, *Pall.*; *S. Salvelinus*, *L.*; *Der Salbling*; *L'Ombre*). Туловище кругловатое, синеватое съ красными крапинами; нижняя челюсть короче верхней; перья брюшныя и проходныя красныя съ бѣлыми краями, спинное перо о 12 распоркахъ, хвостовое нѣсколько раздвоено. Дл. $1\frac{1}{2}$ фуша.

С. 11—12. Г. 15. Б. 9. П. 10. Х. 19.

Вод. въ рѣкахъ Камчатскихъ, куда заходитъ изъ Вѣсточнаго океана и гдѣ называется *Гольцемъ*; изъ Охотскаго же моря заходитъ въ рѣку Охоту и другія въ него впадающія.

254. *С. осенняя* (*S. autumnalis*, *Pall.*; *S. Salmarinus*, *L.*?) Туловище сверху темноватое съ бѣловатыми пятнами, бока сѣроватыя съ пятнами бурыми; нижняя челюсть нѣсколько длиннѣе верхней; хвостовое перо полураздвоенное, проходное темно-красное обѣ 11 распоркахъ. Дл. около $1\frac{1}{2}$ фуша.

С. 11. Г. 15. Б. . . . П. 12. Х.

Вод. въ Невѣ, куда заходитъ въ Октябрѣ мѣсяцѣ въ большемъ количествѣ.

255. *С. Кунджа* (*S. Leucomaenis*, *Pall.*; *S. Kundsha*, *Pall. et Linn.-Gm.*). Туловище сребристое, сверху нѣсколько синеватое, спина съ бѣлыми пятнами; ниж-

няя челюсть нѣсколько длиннѣе верхней; хвостовое перо раздвоенное. Дл. около $1\frac{1}{2}$ фута.

Вод. въ Сѣверномъ и Восточномъ океанахъ, откуда и заходитъ въ устья рѣкъ, впадающихъ въ сіи моря.

236. *С. Тальмень* (*S. fluviatilis*, *Pall.*; *S. Taimen*, *Pall. et Linn. - Gm.*). На спинѣ передъ плавающимъ перомъ находилъ неглубокая бороздка; туловище сверху темноватое съ черными пятнами; плавающие перья: проходное и хвостовое раздвоенное, яркаго краснаго цвѣту. Дл. около 2 фута.

С. 12—13. Г. 14. Б. 9. П. 10—11. Х. 19.

Вод. въ Сибирскихъ рѣкахъ, впадающихъ въ Обь, Иртышъ, Лену, Енисей и въ самыхъ сихъ рѣкахъ. — Молодые около Р. Енисея называются *Гольцами*.

237. *С. Ленокъ* (*S. Coregonoides*, *Pall.*; *S. Lenok*, *Pall. et Linn. - Gm.*). Верхняя челюсть длиннѣе нижней; туловище сверху сѣровато-серебристое и золотистое съ пятнами и крапинами темными; брюшные и проходные перья красныя, хвостовое раздвоенное на двѣ неровныя половины.

С. 8—13. Г. 16. Б. 10. П. 11—12. Х.

Вод. въ Оби, Иртышѣ, Енисеѣ, Ленѣ, Вишнѣ и въ рѣкахъ, въ нихъ впадающихъ; есть также и въ Байкалѣ. Около Алтайскихъ горъ называется *Кузкуземъ*.

238. *С. Чавича* (*S. orientalis*, *Pall.*). Рыло коническое островатое; туловище серебристое; хвостовое перо нѣсколько раздвоенное (луновидное) съ пятнами, проходное перо о 15 распоркахъ. Дл. около 3 и $3\frac{1}{2}$ футовъ.

С. 12. Г. 16. Б. 10. П. 15. Х.

Вод. въ Восточномъ океанѣ, откуда заходитъ въ Камчатскія рѣки. Мясо ея красное, очень вкусное.

239. *С. Ломокъ* (*S. Lysaodon, Pall.*). Туловище сребристое; *челюсти длинныя*, усаженные большими зубами, на концы закрученные и перекрещивающія одна другую; проходное плавательное перо красное о 16 распоркахъ, хвостовое раздвоенное. *Дл.* около 2. ф.

С. 11. *Г.* 14. *Б.* 10—11. *П.* 15. *Х.* 21.

Вод. въ Восточномъ океанѣ и Охотскомъ морѣ, откуда заходитъ въ Камчатскія рѣки и другія, въ сказанныя моря впадающія; въ Камчаткѣ она извѣстна подъ именемъ *красной рыбы*.

240. *С. Кайку* (*S. Lagocerphalus, Pall.*). Туловище сребристое, *рыло очень тупое*; спинное плавательное перо о 17 распоркахъ, хвостовое перо раздвоенное. *Дл.* около 2 футовъ.

С. 14. *Г.* 14. *Б.* 10. *П.* 17. *Х.* 19.

Вод. въ Восточномъ океанѣ и Охотскомъ морѣ, откуда заходитъ въ рѣки, въ нихъ впадающія.

241. *С. Псетрякъ* (*S. purpuratus, Pall.*). Туловище темное съ желтоватыми и черными пятнами круглыми и луновидными: *на бокахъ красная полоса*; плавательныя перья всѣ пестрыя: въ спинномъ и проходномъ по 12 распорокъ, хвостовое перо луновидное. *Дл.* около $1\frac{1}{2}$ фута.

С. 12. *Г.* 14. *Б.* 10. *П.* 12. *Х.* 18.

Вод. въ Восточномъ океанѣ, откуда заходитъ въ рѣки, въ него впадающія. Въ Камчаткѣ называютъ его *Мыкисомъ*.

242. *С. Горбуша* (*S. Proteus, Pall.*). Туловище сребристое безъ пятенъ, рыло коническое, но со временемъ измѣняющееся и представляющее челюсти загнутыя крючкомъ; плавательное проходное перо красное о 14 распоркахъ, *хвостовое перо въ пятнахъ* и раздвоенное. *Дл.* около 2 футовъ.

С. 12. Г. 15. Б. 10. П. 14—15. Х. . . .

Вод. въ Восточномъ океанѣ и Охотскомъ морѣ, откуда и заходитъ въ рѣки, въ сіи моря впадающія.

243. *С. бѣлая рыба* (*S. sanguinolentus, Pall.*). Туловище сребристое съ темными пятнами; верхняя закривленная челюсть длиннѣе нижней; плавательныя перья: *спинное жирное и верхняя половина раздвоеннаго хвостоваго пера въ пятнахъ*, проходное перо о 14 распоркахъ. *Дл.* около 3 футовъ.

С. 11. Г. 14. Б. 10. П. 14. Х. . . .

Вод. въ Камчатскихъ рѣкахъ и озерахъ, заходя въ нихъ изъ Восточнаго океана. Вышедшія изъ моря рыбы бывающъ совершенно бѣлыя, но поживъ въ рѣкахъ, измѣняются значительнымъ образомъ въ цвѣтъ. Мясо вкусное.

244. *С. Пенжинская* (*S. Penshinensis, Pall.*). Голова коническая, челюсти длинныя: нижняя длиннѣе верхней; туловище и всѣ плавательныя перья въ черныхъ крапинахъ; *хвостовое перо безъ выемки*, въ проходномъ перѣ 10 косточекъ. *Дл.* около $\frac{3}{4}$ аршина.

С. 12. Г. 15. Б. 11. П. 10. Х. 19.

Вод. въ Пенжинской губѣ, откуда заходитъ въ рѣки, въ нее впадающія. *Меркѣ.*

245. *С. Японская* (*S. Japonensis, Pall.*). Туловище сребристое безъ пятенъ; нижняя челюсть длиннѣе верхней; *проходное плавательное перо о 16 распоркахъ*, хвостовое луновидное. *Дл.* около 2 ф.

С. 11—12. Г. 16. Б. 11. П. 16. Х. 19.

Вод. около Курильскихъ острововъ. *Меркѣ.*

246. *С. гладкая* (*laevigatus, Pall.*). Туловище сребристое безъ пятенъ, *рыло тупое*; *плавательное спинное перо обѣ 11 распоркахъ*, хвостовое раздвоенное. *Дл.* около фута.

С. 11. Г. 13. Б. 8. П. 10. Х. . . .

Вод. около Курильскихъ острововъ. Меркѣ.

Б. СНѢТКИ (*Osmeri*), у которыхъ туловище серебристое безъ пятенъ, зубы во рту мѣлкіе; жаберная перепонка о 7—8 косточкахъ, при брюшныхъ перьяхъ нѣтъ продолговатой чешуйки.

247. С. Корюха, (*S. Eperlanus*, L.; *Der Seestint*; L'Eperlan). Туловище полупрозрачное, кругловатое; въ проходномъ плавательномъ перѣ 15—16. распорокъ; челюсти почти равныя (нижняя чуть-чуть длиннѣ верхней). Дл. около 12 д.

Вод. въ Балтійскомъ морѣ, Бѣломъ, Охотскомъ и омывающемъ Камчатку, изъ которыхъ поднимаются въ рѣки, въ нихъ впадающія.

248. С. Снѣтокъ (*S. Spirinchus*, Pall.). Туловище серебристое, нижняя челюсть длиннѣ верхней; въ проходномъ плавательномъ перѣ 15 распорокъ. Дл. около 5 дюймовъ.

С. 8—9. Г. 12. Б. 8. П. 15. Х. . . .

Вод. въ рѣчкахъ и озерахъ по всей почти Россіи и въ Камчаткѣ: лучшіе и вкуснѣйшіе ловятся въ Бѣломъ озерѣ (Бѣлозерскіе снѣпки). Впрочемъ подъ именемъ снѣпковъ продается вмѣстѣ съ ними и другая самая мѣлкая рыба, или лучше сказать, молоденькія рыбки разныхъ родовъ высушенныя, а особливо Чехони.

249. С. гуртовая (*S. socialis*, Pall.). Туловище сверху зеленоватое: боковой рубецъ усаженъ жесткими тоненькими щетинкатыми чешуйками; въ проходномъ перѣ 22 распорки. Дл. около 7. дюйм.

Вод. въ Восточномъ океанѣ, около Камчатки и острововъ, лежащихъ между Камчаткою и Америкою.

250. С. пахучая (*S. olidus*, Pall.). Туловище серебристое, сверху темно-сѣрое; челюсти почти

одинакой длины; въ проходномъ плавательномъ перѣ 16 косточекъ. Дл. около $4\frac{1}{2}$ дюймовъ.

С. 9. Г. 11. Б. 8. П. 15—16. Х. . .

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ Камчатскихъ. Свѣжая сильно пахнетъ.

В. СИГИ (Corregoni). Туловище большею частію безъ пятенъ, покрытое крупными чешуями; зубы во рту маленькіе, или ихъ вовсе нѣтъ; при брюшныхъ плавательныхъ перьяхъ по маленькой продолговатой чешуйкѣ; хвостовое перо раздвоенное.

251. *С. Харіусъ* (S. Thymallus, L.; Die Aesche, L'Ombre d'Auvergne). Верхняя челюсть длиннѣ нижней; туловище съ полосами идущими вдоль и состоящими изъ почекъ; спинное плавательное перо большое, съ пятнами, о 20—23 распоркахъ. Дл. отъ 1 до 2 ф.

С. 20—23. Г. 15. Б. 10. П. 10. Х. 19.

Вод. по всей почти Россіи въ чистыхъ и не очень глубокихъ рѣкахъ, но въ большемъ количествѣ въ Сибири. *S. arcticus*, Pall.; есть молодой Харіусъ.

252. *С. Нельма* (S. Leucichthys, Gùldenst. et S. Nelta, Pall.). Голова длинная: нижняя челюсть длиннѣ верхней, копорая приплюснута; туловище брюшное. Дл. около 1 аршина и болѣе.

С. 13. Г. 14—16. Б. 11. П. 14. Х. 21.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Каспійскомъ морѣ, откуда заходитъ въ рѣки, въ сіи моря впадающія: въ большемъ количествѣ въ рѣкахъ Сибирскихъ; на Волгѣ слыветъ *Бълорыбицею*.

253. *С. Сигъ* (S. Lavaretus, Lin.; Der Snäpel; Le Lavaret.). Верхняя челюсть длиннѣ нижней, тупая, съ двумя шипчиками; туловище длинное; въ спинномъ плавательномъ перѣ 14 распорокъ. Дл. около $\frac{1}{2}$ аршина и болѣе.

С. 12. Г. 17. Б. 11. П. 14. Х. 20.

Вод. въ Западной и Сѣверной части Россіи и Сибири въ озерахъ и большихъ рѣкахъ, впадающихъ въ Балтійское море и Сѣверный океанъ. Спина сѣровая, бока синеватые, а пониже желтоватые, исподъ серебристый. Въ Сибирскихъ рѣкахъ водится особый выродокъ Сига, извѣстный въ Сибири подъ именемъ *Шокура*, у котораго въ спинномъ перѣ 12 распорокъ. *Дл.* около 2 фузовъ.

254. *С. Муксунъ* (*S. Muksun, Pall.*). *Туловище широкое, спина очень выпуклая*: въ спинномъ перѣ 13 распорокъ; верхняя челюсть длиннѣ нижней и съ двумя шишечками. *Дл.* около 2 фузовъ.

С. 13—14. Г. 16. Б. 11. П. 11—13. Х. 19.

Вод. въ Ледовитомъ морѣ, откуда осенью поднимается въ рѣки, въ него впадающія, но въ Р. Енисеѣ его нѣтъ. Спина темная, а бока серебристые.

255. *С. Пыджіянъ* (*S. Polcur et Pydshian, Pall.*). *Рыло тупое выпуклое, а особливо передъ глазами выпуклость очень приметна*; проходное плавапелное перо о 16 распоркахъ; прироски близъ брюшныхъ перьевъ короткіе, трех-угольные. *Дл.* около 2 ф.

С. 13. Г. 14. Б. 11. П. 16. Х. 19.

Вод. въ Ледовитомъ морѣ, откуда поднимается въ рѣку Обь. Похожъ на предыдущую породу, но туловище у него по срединѣ гораздо шире.

256. *С. Чиръ* (*S. Nasutus et Nasus, Pall.*). *Рыло тупое, ротъ маленький*; въ плавапелныхъ перьяхъ спинномъ и проходномъ по 13 распорокъ: приросокъ у брюшныхъ перьевъ чрезвычайно короткій, едва длиннѣ чешуй. *Дл.* $1\frac{1}{2}$ фуза.

С. 12—13. Г. 18. Б. 11. П. 13. Х. 19.

Вод. въ рѣкахъ: Оби, Ковымъ, Индигиркѣ и другихъ, впадающихъ въ Сѣверный океанъ. Спина сізая, а бока серебристые.

257. *С. морской Сигъ* (*S. Oxyrhinchus*, *Pall.*; *S. Margaena*, *Lin-Gm?*) Рыло длинное, тупое, ротъ маленький; проходное плавательное перо красноватое о 14 распоркахъ, у брюшныхъ перьевъ приростокъ очень тонокъ и мягокъ. Дл. около 2 фузовъ.

С. 12. Г. 16. Б. 12. П. 14. Х. . . .

Вод. въ Байкалѣ, и въ рѣкахъ Енисеѣ, Ангартѣ, Ленѣ и другихъ Сибирскихъ; спина темная, бока синевато-сребристые, а брюхо бѣлое. Весьма вкусная рыба.

258. *С. Валиокъ* (*S. Microstomus*, *Pall.*). Ротъ маленький; шуловище цилиндрическое; нижнія плавательныя перья красноватыя, а спинное и проходное о 10 распоркахъ. Дл. около 2 фузовъ.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ и Восточномъ, откуда поднимается въ рѣки: Лену, Индигирку, Колыму, Охоту и въ рѣки Камчатскія. Похожъ на морскаго Сига, но цвѣтомъ гораздо блѣднѣе.

259. *С. Омуть* (*S. Omul*, *Lepesch.*; *S. autumnalis*, *Pall.*; *S. migratorius*, *Georgi*). Нижняя челюсть длиннѣе верхней; у хвостоваго раздвоеннаго пера верхняя половина больше нижней: плавательное перо о 13 распоркахъ, жирное перо зазубренное. Дл. около $\frac{1}{2}$ арш.

С. 11. Г. 16. Б. 12. П. 13. Х. . . .

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ, откуда осенью поднимается въ безчисленномъ множествѣ и заходитъ въ Печору, Енисей, Лену и въ рѣчки въ нихъ впадающія, а чрезъ Тунгузку и Ангарту въ Байкалѣ. Спина темноватая, бока синеватые, а низъ сребристый.

260. *С. Сирокъ* (*S. Wimba*, *L.*). Нижняя челюсть нѣсколько длиннѣе верхней; плавательное спинное перо о 13 распоркахъ, жирное зазубренное. Дл. около 12 дюймовъ.

С. 13. Г. 17. Б. 12. П. 16—17. Х. 19.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ, откуда заходитъ въ Обь и другія рѣки, въ Сѣверный океанъ впадающія.

261. *С. Селдетканъ* (*S. clupeoides*, *Pall.*). *Верхняя челюсть тупая, какъ бы пересѣженная, а нижняя оспрая и длиннѣе верхней; въ проходномъ перѣ 14 распорокъ. Дл. около 12 ф.*

С. 9—10. Г. 14—16. Б. 11. П. 13—14. Х. 19.

Вод. въ Сѣверномъ океанѣ, откуда заходитъ въ Р. Ковиму и Индигирку. Спина дымчатая, бока серебристо-красноватые, а исподъ бѣлый.

262. *С. Мундуктанъ* (*S. cyprinoides*, *Pall.*). *Нижняя челюсть длиннѣе верхней, закругленная; въ проходномъ перѣ 15 распорокъ. Дл. около 1 фуша.*

С. 12. Г. 17. Б. 13. П. 15. Х. 18.

Вод. въ рѣкѣ Ленѣ. *Меркѣ.* Туловище очень сжатое, боковой рубецъ ближе къ брюху.

263. *С. Пеледь* (*S. Pelet*, *Leresch.*). *Челюсти обѣ почти одинакой длины; въ проходномъ плаващельномъ перѣ 15 распорокъ, спинное перо съ косыми темными полосками. Дл. около 1 фуша.*

С. 11. Г. 16. Б. . . . П. 15. Х. . .

Вод. въ рѣкѣ Енисей, Печорѣ и въ нѣкошорыхъ близъ лежащихъ озерахъ.

264. *С. Ряпушка* (*S. Albula*, *L.*). *Нижняя челюсть длиннѣе верхней; въ проходномъ перѣ 15 распорокъ, а въ жаберной перепонкѣ 7. Дл. отъ 8 д. до 10.*

С. 10. Г. 15. Б. 11. П. 14. Х. 20.

Вод. во всѣхъ большихъ озерахъ Сѣверной Россіи въ большомъ количествѣ; въ Сибири попадаетъ рѣже. Сверху синеватая или зеленоватая, а бока серебристые. Въ Москвѣ копченая извѣстна подъ именемъ *Переславскихъ сельдей*.

265. *С. Тугунъ* (*S. Tugun, Pall.*). Голова уже тѣла, сверху острѣя, нижняя челюсть длиннѣ верхней; жирное перо острое, въ проходномъ перѣ 14, а въ спинномъ 12 распорокъ. Дл. около 4. д.

С. 12. Г. 14. Б. 10. П. 14. Х. . . .

Вод. въ Енисеѣ, Ленѣ, Тунгускѣ и другихъ Сибирскихъ рѣкахъ. Спина темноватая, а бока серебристые.

266. *С. черноватая* (*S. Maraena, L. Die Grosse Maraene — La grande Marene*). Верхняя челюсть длиннѣ нижней и какъ бы попережно перерѣзанная, съ двумя на краю дырочками; ротъ безъ зубовъ. Дл. около 2 фуш.

С. 14. Г. 15. Б. 11. П. 15. Х. 20.

Вод. въ нѣкоторыхъ озерахъ Каменецъ - Подольской Губерніи. *Ейхвалдъ*. Спина черноватая, бока синеватые, а брюхо серебристое.

267. *С. Вартманова* (*S. Wartmanni, L.*). Верхняя челюсть какъ бы перерѣзанная попережно, не длиннѣ нижней; шуловище сверху синеватое, безъ пашень, а брюхо бѣлое серебристое. Дл. около 17. д.

С. 15. Г. 17. Б. 12. П. 14. Х. 25.

Вод. въ озерахъ Каменецъ - Подольской Губерніи. *Ейхвалдъ*.

Р. XLV. ШУКА (*Esox, L.*).

Рыло длинное: верхняя челюсть плоская, во рту зубовъ множество, жаберныя крышечки гладкія; плавательныя перья спинное и заднепроходное короткія, прошивуположныя (*).

(*) Рыло у *Шукъ* продолговатое, тупое и широкое; нижняя челюсть съисподи устьяна почками, на тѣлѣ чешуи твердая, плотно сидящая. Прожорливыя рыбы; живутъ въ прѣсныхъ водахъ, а иждъ въ соляныхъ. Едятъ пищу употребляющуюся.

268. *Щ. обыкновенная* (E. Lucius, L. Die Hecht, L'Esocе). Рыло плоское, *нижняя челюсть нѣсколько длиннѣе верхней*; туловище почти чешвероугольное. Дл. около $\frac{5}{4}$ арш.

Вод. въ рѣкахъ и озерахъ всего почти Государства. Молодые зеленоватые, а старые темные съ серебристыми боками и брюхомъ; на бокахъ темная пятна.

269. *Щ. остроносая* (E. Belone, L.). *Объ челюсти шиловидныя*: нижняя длиннѣе верхней, спина зеленая. Дл. $1\frac{1}{4}$ фута (Рис. 40).

Вод. въ Черномъ морѣ около Крымскихъ береговъ. Кости у сей рыбы зеленого цвѣшу; въ Крыму зовутъ ее *Веретеницею*.

(**) Р. Б. колю ч е пер ы я.

Р. XLVI. СОМЪ (Silurus, L.).

Голова большая сплюснутая; *пасть широкая*; *туловище голое безъ чешуи*; *первая распорка спинного или проходного пера колючая и зубчатая* (*).

270. *С. большой* (Glanis, L.; Der Wels; Le Silure). *Усиковъ у него около рта шесть*. Дл. отъ 6 до 16 футовъ. (Рис. 41).

С. 5. Г. 18. Б. 13. П. 90. Х. 17.

Вод. во всѣхъ рѣкахъ Россіи. Цвѣтомъ темно-зеленоваты, но бока свѣшлѣе и брюхо желтое.

(*) *Сомы* живутъ въ прѣсныхъ водахъ и нѣкоторыя ихъ породы принадлежатъ къ весьма большимъ рыбамъ. Туловище у нихъ длинное и покрытое склизью, около рта есть усы; проходное перо проспирается почти до хвоста. Мясо ихъ жирное.

271. *С. маленький* (*S. Asotus, L.*). Отличается отъ большаго 4 усиками. Дл. около $\frac{3}{4}$ аршина.

С. 5. Г. 13. Б. 13. П. 90. Х. 17.

Вод. въ Даурскихъ рѣкахъ: Ингодъ, Шилкъ, Ононъ и другихъ. Вся рыба темнаго цвѣту.

Р. XLVII. ГОЛАВЛЪ (*Mugil, L.*).

Голова уже туловища и покрыта чешуями: ротъ безъ зубовъ; кончикъ нижней челюсти своею выпуклостію входитъ въ выемку, находящуюся на кончикъ верхней челюсти (*).

272. *Г. Кефалъ* (*M. Cephalus, L.*). Туловище съ темными, вдоль идущими полосками. Дл. отъ 6 дюйм. до 12 и болѣе. (Рис. 42)

С. $\frac{4}{7}$. Г. 16. Б. 6. П. 10. Х. 15.

Вод. въ Черномъ морѣ около Крыма въ большомъ количествѣ.

(*) *Голавли* суть рыбы морскія, покрытыя крупными чешуями. Въ жаберной ихъ перепонкѣ при распорки. Спинныхъ перьевъ два оподѣльныхъ, и первое изъ нихъ колючее, хвостовое раздвоенное. Мясо ихъ употребляется въ пищу.

РОСПИСЬ

РОДАМЪ И ПОРОДАМЪ РЫБЪ (*).

А. РЫБЫ ХРЯЩЕВАТОПЕРЫЯ (Pisces Chondropterygij).

П О Р Я Д О К Ъ I.

Р. ХР. СЪ ЖАБРАМИ НЕПОДВИЖНЫМИ (P. Ch. branchijs fixis).

Родъ I. БРЮХОЖАБРИКЪ (Gasterobranchus, Bloch.).

Породы: 1. Б. *слѣпый*. G. coecus, Bloch. tab. 413.

Р. II. МИНОГА (Petromyzon, Lin.)

Породы: 1. М. *морская*. P. marinus. Bl. tab. 77.
2. М. *Вьюнъ*. P. fluviatilis. Bl. t. 78.
f. 1.

(*) На Рускомъ языкѣ мы не имѣемъ еще Естественной Исторіи рыбъ, а особливо отечественныхъ, и при которой были бы приложены изображенія оныхъ раскрашенныя, а потому я и почелъ за нужное показашъ при сей росписи раскрашенныя изображенія рыбъ, находящіяся въ извѣстномъ почти всѣмъ сочиненіи *Блоха*: Ichtyologie ou histoire naturelle générale et particulière des Poissons, par M. E. Bloch; à Berlin, Paris et Londres. XII. Vol. in folio. 1785 — 1796. Изображенія рыбъ, описанныхъ Гг. Академиками ИМПЕРАТОРСКОЙ Санктпетербургской Академіи Наукъ и которыхъ нѣтъ въ сочиненіи *Блоха*, показаны здѣсь, хотя и не раскрашенныя. Онѣ находятся какъ въ Академическихъ запискахъ, такъ и въ описаніи путешествій Академиковъ. Въ надеждѣ, что скоро выйдутъ въ свѣтъ рисунки рыбъ, надлежащіе къ Палласовой Россійско-Азіятской Зоографіи, я ссылаясь и на нихъ, гдѣ нужно.

3. М. Камчатская. *P. Camtschaticus*. Memoires de l'Acad. de St. - Petersburg. Vol. III. t. 9.
 4. М. безглазая. *P. lumbricalis*. Pall. Zoogr. Ross. V. III. tab. X. f. 1.
 5. М. Планерова. *P. Planeri*. Bl. 78. f. 3.
 6. М. жаберная. *P. branchialis*. Bl. 78. f. 2.

Р. III. А К К У Л А (*Squalus*, L.).

- Породы: 1. А. пестрая. *S. canicula*. Bl. 112.
 2. А. Мокой. *S. Carcharias*. Bl. 119.
 3. А. колючая. *S. Spinax*.
 4. А. синяя. *S. glaucus*. Bl. 86.

Р. IV. Р А Ш П Л Я (*Squatina*, Dumeril).

- Порода: 1. Р. гладкая. *S. laevis*. Bl. 116.

Р. V. С К А Т Ъ (*Raia*, L.).

- Породы: 1. С. щитковый. *R. clavata*. Bl. 83.
 2. С. морская Кам-
 бала. *R. Batis*. Bl. 19.
 3. С. Черноморский. *R. Pontica*. Pall. Zoog.
 tab. VIII. f. 13.
 4. С. Шагъ. *R. fullonica*.
 5. С. морской Комъ. *R. Pastinaca*. Bl. 82.

Р. VI. Х И М Е Р А (*Chimaera*, L.).

- Порода: 1. Х. странная. *Ch. monstrosa*. Bl. 124.



П О Р Я Д О К Ъ II.

Р. ХРЯЩЕВАТО - ПЕРЫЯ СЪ ЖАБРАМИ ПОД-
ВИЖНЫМИ (Р. Chondropterygii branchiis liberis).

Р. VII. О С Е Т Р Ъ (Acipenser, L.)

- Породы: 1. О. обыкновенный. А. *Sturio*. Bl. 88.
 2. О. Осетровый
 шинъ. А. *Schira*. Нов. мага-
 зинъ Еспесств Ист-
 тор. 1828. Кн. V.
 рис. 3.
 3. О. Бѣлуга. А. *Huso*. Bl. 129.
 4. О. Бѣлужій
 шинъ. А. *nudiventris*. Нов. ма-
 газинъ Есп. Ист.
 1828. Кн. 17.
 5. О. Севрюга. А. *Stellatus*. Нов. магаз.
 Есп. Ист. 1828.
 Кн. VII.
 6. О. Стерлядь. А. *Ruthenus*. Bl. 89.
 7. О. Калуга. А. *Orientalis*.

Р. VIII. И Г Л И К Ъ (Syngnathus, L.).

- Породы: 1. И. морской Ко-
 некъ. S. *Hippocampus*. Bl. 109.
 f. 3.
 2. И. Черноморскій. S. *Ponticus*.
 3. И. пестрый. S. *variegatus*.
 4. И. серебристый. S. *argentatus*.
 5. И. синеватый. S. *Typhle*. Bl. 91. f. 1.
 6. И. Игла рыба. S. *Acus*.
 7. И. безперый. S. *Aequoreus*.
 8. И. змѣйчатый. S. *Ophidion*. Bl. 91. f. 3.
 9. И. круглохво-
 стый. S. *pelagicus*. Bl. 109. f. 4.

Р. IX. ПИНАГОРЬ (*Cyclopterus*, L.).

- Породы: 1. П. угластый. *C. Lumpus*. Bl. 90.
 2. П. Стеллеровъ. *C. Stelleri*.
 3. П. брюшистый. *C. ventricosus*. Pall. Z.
 IX. f. 2 — 4.
 4. П. морской Уш-
 канъ. *C. gelatinosus*.
 5. П. Канаисъ. *C. Calliodon*.
 6. П. полосатый. *C. Liparis*. Nov. acta
 Acad. Petr. Vol. XVIII.
 Tab. V. f. 2 — 3.

Р. X. Л Я Г В А (*Lophius*, L.).

- Порода: 1. Л. обыкновенная. *L. piscatorius*. Bl. 87.



Б). РЫБЫ КОСТИСТЫЯ (Р. Ossei).

П О Р Я Д О К Ъ III.

Р. ГОЛОБРЮХІЯ (Р. Apodes).

*Р. Г. м л е к о п е р ы я.

Р. XI. У Г О Р Ъ (*Muraena*, L.).

- Породы: 1. У. обыкновенный. *M. Anguilla*. Bl. 73.
 2. У. синеватый. *M. Conger*. Bl. 155.

Р. XII. З У Б А Т К А (*Anarhichas*, L.).

- Породы: 1. З. пестрая. *A. pantherinus*. Acad. Pet-
 rop. 1781. Tab. 13.
 2. З. Капела. *A. orientalis*.
 3. З. кусачка. *A. Lupus*. Bl. 74.

Р. XIII. ПЕСКОРОЙ (*Ammodytes*, L.).

- Породы: 1. П. сѣроватый. *A. Tobianus*. Bl. 75. f. 2.
 2. П. бѣловатый. *A. septipinnis*.

(*) К о л ю з е н е р ы я.

XIV. ОШИБЕНЬ (*Orhidium*, L.).

- Породы: 1. О. бородастый. *O. barbatum*. Bl. 154.
 2. О. оцковый. *O. ocellatum*. Med. de
 l'Acad. de St.-Petersb.
 V. VIII. tab. VIII. f. 2.

Р. XV. ГОЛОМЯНК'А (*Elaeorhous*, Pall.).

- Порода: 1. Г. Байкальская. *E. Baicalensis*. Nova Act.
 Petrop. I. t. 9.
 f. 2. 3.



П О Р Я Д О К Ъ IV.

Р. К. ГОРЛОПЕРЫЯ (Р. О. Jugulares).

(*) Р. Г. м л е к о п е р ы я.

Р. XVI. ТРЕСКА (*Gadus*, L.).

- Породы: 1. Т. обыкновенная. *G. Morrhu*a. Bl. 64.
 2. Т. пестрая. *G. Callarias*. Bl. 63.
 3. Т. Вахня. *G. Wachnia*.
 4. Т. большезголовая. *G. macrocephalus*. Mem.
 de l'Acad. de St.-
 Petersburg. III. t. 16.
 5. Т. тонкая. *G. gracilis*. Mem. de
 l'Acad. de St.-Petersb.
 III. t. 18.
 6. Т. Навага. *G. Navaga*. Commentar.
 Petrop. XIV. t. 12.

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 7. Т. мѣдѣнистая. | G. <i>Chalcogrammus</i> . |
| 8. Т. Сайда. | G. <i>Saida</i> . |
| 9. Т. маленькая. | G. <i>pygmaeus</i> . |
| 10. Т. коемѣзчатая. | G. <i>Fimbria</i> . |
| 11. Т. бородачатая. | G. <i>barbatus</i> . Bl. 166. |
| 12. Т. зеленоватая. | G. <i>virens</i> . |

Р. XVII. НАЛИМЪ (*Enchelyopus*, *Schneider*)

- Породы:
- | | |
|------------------|--|
| 1. Н. Менюкѣ. | E. <i>Lota</i> . Bl. 70. |
| 2. Н. Лохъ. | E. <i>Molva</i> . Bl. 69. |
| 3. Н. усатый. | E. <i>Mustela</i> . |
| 4. Н. одноперый. | E. <i>mediterraneus</i> . Pall. Z. T. LII. f. 2. |

Р. XVIII. СЛИЗНЯКЪ (*Blennius*, *L.*)

- Породы:
- | | |
|-----------------------|--|
| 1. С. Собачка. | B. <i>Sanguinolentus</i> . Pall. Zoogr. T. XL. |
| 2. С. темный. | B. <i>Varus</i> . Pall. Z. t. XLI. f. 1. 2. |
| 3. С. красивый. | B. <i>lepidus</i> . Pall. Z. T. XLI. f. 3. 4. |
| 4. С. ушастый. | B. <i>auritus</i> . Pall. Z. T. XLI. f. 5. |
| 5. С. ошковый. | B. <i>Gunellus</i> . Bl. 71. f. 1. |
| 6. С. гребенчатый. | B. <i>Galerita</i> . |
| 7. С. безбрюхо-перый. | B. <i>alectorolophus</i> . Pall. Z. T. XLII. f. 1. |
| 8. С. бородавчатый. | B. <i>Dolichogaster</i> . Pall. Z. XLII. f. 2. |
| 9. С. угревидный. | B. <i>anguillaris</i> . Pall. Z. XLII. f. 3. |
| 10. С. розовый. | B. <i>roseus</i> . Pall. Z. XLII. f. 4. |
| 11. С. полосатый. | B. <i>Taenia</i> . |
| 12. С. многооусый. | B. <i>polyactoccephalus</i> . |
| 13. С. живородящий. | B. <i>viviparus</i> . Bl. 72. |

Р. XIX. СМОЧНИКЪ (*Trachinus*, *L.*).

Порода: 1. С. *Драконъ*. Т. *Draco*. Bl. 61.

Р. XX. КРАСУНЪ (*Callionimus*, *L.*)

Породы: 1. К. *нарядный*. С. *festivus*. Pall. Z. Т. XXVII.
2. К. *Лиры*. С. *Lyra*. Bl. 161.



П О Р Я Д О К Ъ V.

Р. К. ГРУДОПЕРЫЯ (*P. Thoracici*)

* Р. Г. *м л е к о п е р ы я*.

Р. XXI. КАМБАЛА (*Pleuronectes*, *L.*).

Породы: 1. К. *звѣздчатая*. Р. *stellatus*. Mem. de l'Acad. de St.-Petersb. III. t. 10.
2. К. *Полурыбокъ*. Р. *Maeoticus*. Pall. Z. LXXXVII.
3. К. *еладкая*. Р. *Rhombus*. Bl. 43.
4. К. *большая*. Р. *maximus*. Bl. 49.
5. К. *рябая*. Р. *Passer*. Bl. 50.
6. К. *Палтусъ*. Р. *Hippoglossus*. Bl. 47.
7. К. *шероховатая*. Р. *Solea*. Bl. 45.
8. К. *желтая*. Р. *Limanda*. Bl. 42.
9. К. *Полурыбица*. Р. *Flesus*. Bl. 44.
10. К. *пестрая*. Р. *Platessa*. Bl. 42.
11. К. *шишковатая*. Р. *quadrilobatus*.
12. К. *льдистая*. Р. *glacialis*.
13. К. *шершавая*. Р. *cicatricosus*.
14. К. *жесткая*. Р. *asper*.
15. К. *носастая*. Р. *nasutus*. Pall. Z. LXXXIX.
16. К. *раскосая*. Р. *luscus*.

* * Р. Г. колюзерыя.

Р. XXII. КРАСНОБОРОДКА (*Mullus*, *L.*).

- Породы: 1. К. *полосатая*. *M. Surmuletus*. Bl. 57.
2. К. *Султанская*. *M. barbatus*. Bl. 348. f. 2.

Р. XXIII. Т Р И Г Л А (*Trigla*, *L.*).

- Породы: 1. Т. *красная*. *T. Cuculus*. Bl. 59.
2. Т. *прыгающая*. *T. Hyrax*. Pall. Z. XLIX.
f. 3.

XXIV. Р А М Ш А (*Cottus*, *L.*).

- Породы: 1. Р. *Бычокъ*. *C. Gobio*. Bl. 39. f. 2.
2. Р. *Подкамен-*
щикъ. *C. quadricornis*. Bl. 108.
3. Р. *пестрая*. *C. anostomus*. Pall. Z.
XXI.
4. Р. *Ряца*. *C. Scorpius*. Bl. 40.
5. Р. *Жаюкъ*. *C. Jaios*.
6. Р. *многоуголь-*
ная. *C. Polyacanthocephalus*.
Pall. Z. XXIII.
7. Р. *широкоголовая*. *C. platycephalus*. Pall. Z.
XXIV.
8. Р. *Рогатка*. *C. Diceraus*. Mem. de
l'Acad. de St.-Petersb.
III. t. 13.
9. Р. *пестичная*. *C. pistilliger*. Pall. Z.
XX. f. 3. 4.
10. Р. *Мертенсова*. *C. Mertensii*.
11. Р. *маленькая*. *C. minutus*. Pall. Z. XX.
f. 5. 6.

Р. XXV. КУЛНАГЪ (*Phalangista*, *Pall.*).

- Породы: 1. К. *осетровый*. *Ph. acipenserinus*. Pall. Z.
XVII.
2. К. *Японский*. *Ph. Japonicus*.

3. К. *Лисица*. Ph. *Cataphractus*. Bl. 38.
f. 3.
4. К. *обыкновенный*. Ph. *loricatus*. Pall. Z.
XIX.
5. К. *веретенчатый*. Ph. *fusiformis*. Mem. de
l'Acad. de St.-Pe-
tersb. IV. t. 14.
6. К. *четырёхрогий*. Ph. *quadricornis*.

Р. XXVI. ГИКЖАКТЪ (*Hemilepidotus*, Tiles.)

Порода: 1. Г. *Тилезиев*. Н. *Tilesii*. Pall. Z. XXV.

Р. XXVII. СКОРПЕНА (*Scorpaena*, L.).

Порода: 1. С. *морской Ерш*. S. *Porcus*. Bl. 181.

Р. XXVIII. ТОНКОЗУБЪ (*Trichodon*, Cuv.)

Порода: 1. Т. *Стеллеров*. T. *Stelleri*. Pall. Z. L.
f. 1.

Р. XXIX. КАНИШИКЪ (*Blepsias*, Cuv.)

Породы: 1. К. *тридольный*. B. *trilobus*.
2. К. *двудольный*. B. *bilobus*.

Р. XXX. КОЛЮШКА (*Gasterosteus*, L.).

Породы: 1. К. *обыкновенная*. G. *pungitius*. Bl. 53. f. 4.
2. К. *колючая*. G. *aculeatus*. Bl. 53. f. 3.
3. К. *Хахалга*. G. *cataphractus*. Mem. de
l'Acad. de St.-Petersb.
III. t. 8. f. 1.

Р. XXXI. ЕРШЪ (*Acerina*, Cuvier).

Породы: 1. Е. *обыкновенный*. A. *vulgaris*. Bl. 53. f. 2.
2. Е. *Бабир*. A. *Rossica*. Nov. Com-
ment. Petropol. XIX.
t. 11.

Р. XXXII. О К У Н Ъ (Perca L.)

- Породы: 1. О. *рѣзный*. P. *fluviatilis*. Bl. 52.
 2. О. *Судакъ*. P. *Lucioperca*. Bl. 51.
 3. О. *морскій Суда-
дакъ*. P. *Labrax*.
 4. О. *Бершикъ*. P. *Volgensis*. Nov. Mem.
 de la Société de Na-
 tural. de Moscou. Vol.
 II. t. 25.
 5. О. *Усмакъ*. P. *variabilis*.

Р. XXXIII. С Ц І Е Н А (Sciaena, L.).

- Породы: 1. С. *голозубая*. S. *Gymnodon*. Pall. Z. LII. f. 1. 2.
 2. С. *чернохвостая*. S. *melanura*. Pall. Z. LII. f. 1. 2.

Р. XXXIV. К О Р А Ц И Н Ъ (Coracinus, Pall.).

- Породы: 1. К. *сжатый*. C. *Chalcis*. Pall. Z. LIII. f. 1. 2.
 2. К. *кругловатый*. C. *Boops*. Pall. Z. LV.

Р. XXXV. Г У Б А Ч Ъ (Labrus, L.).

- Породы: 1. Г. *красивый*. L. *Polichrous*. Pall. Z. LVI.
 2. Г. *зеленоватый*. L. *aeruginosus*. Pall. Z. LVII.
 3. Г. *темный*. L. *fuscus*. Pall. Z. LVIII.
 4. Г. *спрый*. L. *cinereus*.
 5. Г. *очковый*. L. *perspicillatus*. Pall. Z. LIX. f. 1.
 6. Г. *пестрый*. L. *capistratus*. Pall. Z. LIX. f. 2. 3.
 7. Г. *крапинный*. L. *fraenatus*. Pall. Z. LX. f. 1.

8. Г. курносый. *L. simus.* Pall. Z. LX.
f. 2.
9. Г. оливковый. *L. prasostictes.* Pall. Z.
LXI. f. 1.

Р. XXXVI. ТЕРПУКЪ (*Labrax, Pall.*).

- Породы: 1. Т. тупоголовый. *L. lagocephalus.* Pall.
LXII.
2. Т. десятилинный.
 L. decagrammus. Pall.
 LXII. f. 2.
3. Т. хохолковый. *L. superciliosus.* Pall. Z.
LXIII. f. 1.
4. Т. одноперый. *L. monopterygius.* Pall. Z.
LXIII. f. 2.
5. Т. осмилинный.
 L. octogrammus. Pall. Z.
 LXIV. f. 1.
6. Т. шестилинный. *L. hexagrammus.* Pall.
Z. LXIV. f. 2.

Р. XXXVII. МРЕЖНИКЪ (*Sparus, L.*).

- Породы: 1. М. зеленоватый. *S. virescens.*
2. М. спроватый. *S. lividus.*
3. М. пьжный. *S. tenellus.* Pall. Z. LXI.
f. 2.

Р. XXXVIII. МАКРЕЛЬ (*Scomber, L.*).

- Породы: 1. М. обыкновенная. *S. Scomber.* Bl. 54.
2. М. Понтийская. *S. Ponticus.*
3. М. ящеричная. *S. Lacerta.* Pall. Z. XLVI.
f. 2.
4. М. зубѣатохвостая.
 S. Trachurus. Pall. Z.
 XLVII. f. 1.
5. М. сжатая. *S. Sypterus.* Pall. Z.
XLVII. f. 2.

Р. XXXIX. ГОЛОВАЧЬ (*Gobius* L.).

Породы :	1. Г. бычокъ.	<i>G. batrachocephalus</i> . Pall. Z. XXVIII.
	2. Г. чернорылый.	<i>G. melanostomus</i> . Pall. Z. XXIX.
	3. Г. змееголовый.	<i>G. ophiocephalus</i> . Pall. Z. XXX. f. 1. 2. 3.
	4. Г. ширококрылый.	<i>G. platirostris</i> . Pall. Z. XXXII.
	5. Г. толстоголовый.	<i>G. Cephalarges</i> . Pall. Z. XXXIII.
	6. Г. блювкѣй.	<i>G. Chilo</i> . Pall. Z. XXXIV.
	7. Г. черный.	<i>G. Melanio</i> . Pall. Z. XXXV.
	8. Г. зеленоватый.	<i>G. virescens</i> . Pall. Z. XXXVI.
	9. Г. мягкоперый.	<i>G. quadricapillus</i> . Pall. Z. XXXVII.
	10. Г. пестрый.	<i>G. exanthematosus</i> . Pall. Z. XXX. f. 3. 4.
	11. Г. желтоватый.	<i>G. Cobitis</i> . Pall. Z.
	12. Г. крапинный.	<i>G. marmoratus</i> . Pall. Z. XXX. f. 4.
	13. Г. рѣчный.	<i>G. fluviatilis</i> . Bl. 38. f. 2. 4.
	14. Г. головастый.	<i>G. macrocephalus</i> . Pall. Z. XXXVIII.



П О Р Я Д О К ъ VI.

Р. БРЮХОПЕРЫЯ (Р. О. Abdominales).

*. Р. Б. м л е к о п е р ы я.

Р. XL. В Ъ Ю Н Ъ (C o b i t i s , L.).

- Породы: 1. В. Пискарь. C. *barbatula*. Bl. 31. f. 3.
 2. В. П о д к а м е н - C. *Taenia*. Bl. 31. f. 2.
 щ и к ъ.
 3. В. обыкновенный. C. *fossilis*. Bl. 31. f. 1.

Р. XLI. К А Р П И Я (Cyprinus, L.).

- Породы: 1. К. обыкновенная. C. *Carpio*. Bl. 16.
 2. К. Усачъ. C. *Barbus*. Bl. 18.
 3. К. Булатмай. C. *chalybatus*. Pall. Z. LXII.
 4. К. Мурза. C. *mystaceus*. Nov. Comment. Petrop. XVII. Tab. 8. f. 3 — 5.
 5. К. желтая. C. *Capito*. Nov. Comment. Petrop. XVII.
 6. К. Пищуль. C. *Fundulus*. Nov. Comment. Petrop. XVII. f. 1. 2.
 7. К. Пискарь. C. *Gobio*. Bl. 8. f. 2.
 8. К. Линь. C. *Tinca*. Bl. 14.
 9. К. Карась. C. *Carassius*. Bl. 11.
 10. К. красноватая. C. *Gibelio*. Bl. 12.
 11. К. Вырзубъ. C. *Cephalus*.
 12. К. Мунда. C. *Peronurus*. Pall. Z. LXVI. f. 2.
 13. К. Голавль. C. *Orfus*. Bl. 96.
 14. К. Голубель. C. *Dobula*. Bl. 5.
 15. К. Подустъ. C. *Nasus*. Bl. 3.
 16. К. Конь. C. *Labeo*. Pall. Z. LXIII. f. 1.

- | | |
|---------------------|---|
| 17. К. Носатка. | <i>C. rostratus.</i> M e m. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. t. 15. |
| 18. К. Шересперъ. | <i>C. rapax.</i> Bl. 7. |
| 19. К. красноперъ. | <i>C. leptocephalus.</i> Pall. Z. LXIII. f. 2. |
| 20. К. Чебакъ. | <i>C. lacustris.</i> |
| 21. К. Язь. | <i>C. Idus.</i> Bl. 36. |
| 22. К. Сорога. | <i>C. rutilus.</i> Bl. 2. |
| 23. К. Плотва. | <i>C. Erythrops.</i> Bl. 1. |
| 24. К. зеленоватая. | <i>C. chrysoprasius.</i> |
| 25. К. Уклея. | <i>C. Leuciscus.</i> Bl. 97. f. 1. |
| 26. К. Вобла. | <i>C. Grislagine.</i> |
| 27. К. Момса. | <i>C. sericeus.</i> Bl. L. |
| 28. К. Селява. | <i>C. Alburnus.</i> Bl. 8. f. 3. |
| 29. К. Тарань. | <i>C. Vimba.</i> Bl. 4. |
| 30. К. Рыбецъ. | <i>C. carinatus.</i> |
| 31. К. Калинка. | <i>C. gibbosus.</i> |
| 32. К. Леицъ. | <i>C. Brama.</i> Bl. 15. |
| 33. К. Ласкиръ. | <i>C. Laskir.</i> |
| 34. К. Синтепа. | <i>C. Ballerus.</i> Bl. 9. |
| 35. К. Синецъ. | <i>C. Blicca.</i> Bl. 10. |
| 36. К. Сапа. | <i>C. Sapa.</i> Pall. Z. LXIX. f. 1. |
| 37. К. Клевецъ. | <i>C. Cleveza.</i> |
| 38. К. Мулявка. | <i>C. Phoxinus.</i> Bl. 8. f. 5. |
| 39. К. Чехонь. | <i>C. cultratus.</i> Bl. 37. |
| 40. К. Скабрія. | <i>C. clupeoides.</i> P a l l. Z. LXIX. f. 2. |
| 41. К. Тарихи. | <i>C. Tarichi.</i> |

Р. XLII. С Е Л Ъ Д Ъ (*Clupea*, L.).

- Породы :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. С. Жельзница. | <i>C. Piltschardus.</i> Pall. Z. XLIV. f. 1. |
| 2. С. обыкновенная. | <i>C. Harengus.</i> Bl. 29. |
| 3. С. Салакушка. | <i>C. Encrasicolus.</i> Bl. 30. f. 2. |
| 4. С. маленькая. | <i>C. Sprattus.</i> Bl. 29. f. 2. |

Р. XLIII. ГОБЗИКЪ (*Atherina*, L.).

Порода: 1. Г. бѣловатый. *A. Hepsetus*. Bl. 393. f. 3.

Р. XLIV. С Е М Г А (*Salmo*, L.).

- Породы:
- | | |
|---------------------|--|
| 1. С. обыкновенная. | <i>S. Salar</i> . Bl. 20 — 98. |
| 2. С. Лохъ. | <i>S. Eriox</i> . |
| 3. С. Лосось. | <i>S. Hucho</i> . Bl. 100. |
| 4. С. Лавраки. | <i>S. Labrax</i> . |
| 5. С. Грошица. | <i>S. Trutta</i> . Bl. 21. |
| 6. С. Форель. | <i>S. Fario</i> . Bl. 22. |
| 7. С. красная. | <i>S. Erithraeus</i> . Bl. 104. |
| 8. С. Курильская. | <i>S. Curilus</i> . |
| 9. С. Малма. | <i>S. Collarias</i> . Pall. Z. LXXII. f. 2. |
| 10. С. осенняя. | <i>S. autumnalis</i> . |
| 11. С. Кунджа. | <i>S. Leucomaenis</i> . Pall. Z. LXXIII. f. 1. |
| 12. С. Тальмень. | <i>S. fluviatilis</i> . Нов. магаз. Есн. Испор. 1830. Кн. I. Рис. 3. |
| 13. С. Ленокъ. | <i>S. Coregonoides</i> . Pall. Z. LXXIV. f. 1. |
| 14. С. Чавича. | <i>S. orientalis</i> . Pall. Z. LXXIX. |
| 15. С. Ломокъ. | <i>S. Lycodon</i> . Pall. Z. LXXVII. f. 1. |
| 16. С. Кета. | <i>S. Lagocephalus</i> . Pall. Z. LXXVII. f. 2. |
| 17. С. Пестрякъ. | <i>S. purpuratus</i> . Pall. Z. LXXVIII. f. 1. |
| 18. С. Горбуша. | <i>S. Proteus</i> . Pall. Z. LXXVIII, f. 2. |
| 19. С. бѣлая рыба. | <i>S. sanguinolentus</i> . Pall. Z. LXXX. |
| 20. С. Пенжинская. | <i>S. Penschinensis</i> . |
| 21. С. Японская. | <i>S. Japonensis</i> . |
| 22. С. гладкая. | <i>S. laevigatus</i> . Pall. Z. LXXXI. f. 1. |

- | | |
|------------------------------|--|
| 23. С. <i>Корюха</i> . | <i>S. Eperlanus</i> . Bl. 28. f. 1. |
| 24. С. <i>Снѣтокъ</i> . | <i>S. Spirinchus</i> . Bl. 28. f. 2. |
| 25. С. <i>гуртовая</i> . | <i>S. socialis</i> . P a l l. Z. LXXXI. f. 2. |
| 26. С. <i>пахучая</i> . | <i>S. olidus</i> . P a l l. Z. LXXXI. f. 3. |
| 27. С. <i>Хариусъ</i> . | <i>S. Thymallus</i> . Bl. 24. |
| 28. С. <i>Нельма</i> . | <i>S. Leucythis</i> . Лепехина
путешествіе II,
Рис. 9, фиг. 1—3. |
| 29. С. <i>Сигъ</i> . | <i>S. Lavaretus</i> . Bl. 25. |
| 30. С. <i>Мукунь</i> . | <i>S. Muksun</i> . P a l l. Z. LXXXIII. f. 2. |
| 31. С. <i>Пыджіанъ</i> . | <i>S. Polcur</i> . P a l l. Z. LXXXIV. f. 1. |
| 32. С. <i>Чиръ</i> . | <i>S. Nasutus</i> . Лепех. пу-
тешес. II, Рис. 13. |
| 33. С. <i>морскій Сигъ</i> . | <i>S. Oxirhinchus</i> . P a l l. Z. LXXXV. f. 1. |
| 34. С. <i>Валиокъ</i> . | <i>S. Microstomus</i> . P a l l. Z. LXXXV. f. 2. |
| 35. С. <i>Омуть</i> . | <i>S. Omul</i> . |
| 36. С. <i>Сирокъ</i> . | <i>S. Wimba</i> . P a l l. Z. LXXXVI. f. 2. |
| 37. С. <i>Селдетканъ</i> . | <i>S. Clupeoides</i> . |
| 38. С. <i>Мундуктанъ</i> . | <i>S. Cyprinoides</i> . |
| 39. С. <i>Пеледь</i> . | <i>S. Pelet</i> . Лепех. пуп.
III. Рис. 12. |
| 40. С. <i>Ряпушка</i> . | <i>S. Albula</i> . Bl. 27. f. 3. |
| 41. С. <i>Тугунъ</i> . | <i>S. Tugun</i> . P a l l. Z. LXXXVI. f. 4. |
| 42. С. <i>черноватая</i> . | <i>S. Maraena</i> . Bl. 27. |
| 43. С. <i>Вартманнова</i> . | <i>S. Wartmanni</i> . Bl. 105. |

Р. XLV. Ш У К А (Е s o x, L.).

- Породы: 1. Ш. *обыкновенная*. Е. *Lucius*. Bl. 32.
2. Ш. *остроноса*. Е. *Belone*. Bl. 33.

(* *) Р. Б. *к о л ю з е н е р ы я*.

Р. XLVI. С О М Ъ (*Silurus, L.*).

Породы: 1. С. *большой*. *S. Glanis*. Bl. 34.
2. С. *маленький*. *S. Asotus*. Pall. Z. XII.

Р. XLVII. Г О Л А В Л Ъ (*Mugil, L.*).

Порода: 1. Г. *Кефаль*. *M. Cephalus*. Bl. 394.



АЛФАВИТНОЕ ОГЛАВЛЕНІЕ РОССИЙ- СКИХЪ РОДОВЫХЪ ИМЕНЪ РЫБЪ.

	Стран.		Стран.
Аккула. - - - - -	3	Налимъ. - - - - -	22
Брюхожабрикъ. - - - - -	1	Осепрѣ. - - - - -	7
Вьюнъ. - - - - -	55	Окунь. - - - - -	41
Гижакъ. - - - - -	37	Ошибень. - - - - -	17
Гобзикъ. - - - - -	70	Пескорой. - - - - -	16
Голавль. - - - - -	84	Пинагоръ. - - - - -	12
Головачъ. - - - - -	51	Рамша. - - - - -	33
Голомянка. - - - - -	18	Ращпля. - - - - -	4
Губачъ. - - - - -	45	Сельдь. - - - - -	68
Ершь. - - - - -	40	Семга. - - - - -	70
Зубашка. - - - - -	15	Скапъ. - - - - -	5
Игликъ. - - - - -	10	Скорпена. - - - - -	38
Камбала. - - - - -	28	Слизнякъ. - - - - -	23
Каншикъ. - - - - -	39	Смочникъ. - - - - -	24
Карпѣя. - - - - -	56	Сомъ. - - - - -	83
Колюшка. - - - - -	39	Сціена. - - - - -	43
Корацинъ. - - - - -	44	Терпукъ. - - - - -	47
Краснобородка. - - - - -	32	Тонкозубъ. - - - - -	38
Красунъ. - - - - -	27	Треска. - - - - -	19
Кулнагъ. - - - - -	36	Тригла. - - - - -	32
Лягва. - - - - -	14	Химера. - - - - -	6
Макрель. - - - - -	50	Угорь. - - - - -	15
Миного. - - - - -	2	Щука. - - - - -	82
Мрежникъ. - - - - -	49		

АЛФАВИТНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ЛАТИНСКИХ РОДОВЫХ ИМЕНЪ РЫБЪ.

	Стран.		Стран.
Acerina. - - - - -	40	Labrus. - - - - -	45
Acipenser. - - - - -	7	Lophius. - - - - -	14
Anarhichas. - - - - -	15	Mugil. - - - - -	84
Ammodites. - - - - -	16	Mullus. - - - - -	32
Atherina. - - - - -	70	Muraena. - - - - -	15
Blennius. - - - - -	23	Ophidium. - - - - -	17
Blepsias. - - - - -	39	Perca. - - - - -	41
Callionimus. - - - - -	27	Petromyzon. - - - - -	2
Chimaera. - - - - -	6	Phalangista. - - - - -	36
Clupea. - - - - -	68	Pleuronectes. - - - - -	28
Cobitis. - - - - -	55	Raia. - - - - -	5
Coracinus. - - - - -	44	Salmo. - - - - -	70
Cottus. - - - - -	33	Sciena. - - - - -	43
Cyclopterus. - - - - -	12	Scomber. - - - - -	50
Cyprinus. - - - - -	56	Scorpaena. - - - - -	38
Elaeorhous. - - - - -	18	Silurus. - - - - -	83
Enchelyopus. - - - - -	22	Sparus. - - - - -	49
Esox. - - - - -	82	Squalus. - - - - -	3
Gadus. - - - - -	19	Squatina. - - - - -	4
Gasterobranchus. - - - - -	1	Syngnathus. - - - - -	10
Gasterosteus. - - - - -	39	Trachinus. - - - - -	24
Gobius. - - - - -		Trichodon. - - - - -	38
Hemilepidotus. - - - - -	37	Trigla. - - - - -	32
Labrax. - - - - -	47		

П Р И Б А В Л Е Н І Е.

Г. Профессоръ *А. Л. Ловецкій* имѣлъ случай замѣтить при новыя породы Осетроваго рода, водящіяся въ разныхъ мѣстахъ Россійской Имперіи. Онѣ будутъ имъ описаны особо и съ приложеніемъ ихъ изображеній. Здѣсь же почтено за нужное упомянуть объ нихъ вкратцѣ.

Р Ы Б Ы с и с у т ь с л ѣ д у ю щ и я :

1. *Донская Севрюга* (*A. Donensis, Lovetski*). Во всемъ похожа на Севрюгу обыкновенную; но рыло у ней короткое плоское, да и сама она короче Севрюги, но толще. Длина ея 28 вершковъ.

Вод. въ р. Донѣ.

2. *Илистая Стерлядь* (*A. aculeatus, Lovetski*). Отличается отъ Стерляди спинными и брюшными жучками, которые у ней снабжены высокими острыми углами и кошорыхъ кончикъ загнутъ назадъ. Голова у ней покрыта подобными же щипками. Длина 6 вершковъ.

Вод. въ Днѣпрѣ.

3. *Камская Стерлядь* (*A. Kamensis, Lovetski*). Похожа на обыкновенную Стерлядь, только рыло у ней плоское, а туловище толще и длиннѣе. Длина ея 26 вершковъ.

Вод. въ р. Камѣ.

Примѣч. Писецку Г. *Ловецкій* видѣлъ по одному только экземпляру сихъ рыбъ, но теперь едва ли можно рѣшительно сказать, суть ли онѣ настоящія породы или только выродки.


О П Е Ч А Т К И.

Напечатано :


Читай :


Стран.	Стр.		
2	2	Petromizon	Petromyzon
4	26	бокамъ.	бокамъ ея.
18	51	чешуями ,	чешуями
—	32	часпью	часпью ,
21	21	коемчатая	каемчатая
25	7	Пензинской	Пенжинской
30	1	die Kliesche	die Kliesche
38	15	Drachencorpf	Drachenkopf
39	16	Пензенской	Пенжинской
41	3	La Kaulbarsch, Die Per- che goujoniere	La Perche goujonnie- re , Die Kaulbarsch.
42	3	темныя	темные
54—29	14	—	14—16.
70 — 9		бѣловатая	бѣловатый
75—20		Пеперякъ	Песпрякъ

1.



Gastrobranchus cecus. Pl.






1. Многоморская *Petromyzon marinus*. L.
 2. Водень. *Petromyzon fluviatilis*. L.




[Faint, illegible text or markings at the bottom of the page, possibly a signature or a date.]


5.



Squalus glacius. L. Аккура суняя.



Pauu.n.a. Squalina taceis. Curv




Скамъ морскоу комо.

Raia Pastinaca. L.




Plum. japonica
Thun. baccata



Chimæra monstrosa. L.





7.



Ocmpho.

Acipenser Sturio. L.






1. Рыбка сумчатая, *Syngnathus Fyphle*. L.
 2. Рыбка сумчатая, *Syngnathus acus*. L.




9.



Монагого угастый. *Cyclopterus Lumpus*. L.

10.



Acaba. Lophus piscatorius. L.




11.





Murana Anguilla L. Scopo.






Byotanka! Anarhichas Lupus. L.





Песчуръ крошечный.
Ammodytes Tobiasius. L.



Овидію бородавчатой.


Ophidium barbatum: L.





Elaeorhynchus Bivalensis. Pall.

Томанка Оука. 1667 г.




Мясеца обыкновенная.
Gadus Morhua. L.





Haumw. Enckelyopus Lota. Schneider.







Plennius viviparus. L.



19.




Сногникъ. *Trachinus Draco* L.



Surpacyr's Aupa. Callyponimus Lyra. L.







Pleuronectes Fluv. *Paralichthys nasus.*




22.




Mullus surmuletus. Краснопёрка паломная.



Muraena Rupia. Triglia Cuculus. L.




Cottus Scorpio. L.
Pannua Pabua.



Hyphessobrycon surcatus. Phalangista Cataphractus. Pall.




Faint, illegible text, possibly a title or description, oriented vertically along the left side of the page.




Surmura Murwzebo. Hemilepidotus Flesui. Cur. D







Скорпена Морской Ерюш. *Scorpaena porcus*. L.








Монкозудъ Омерепоѣ. Trichodon Stelleri. Cuv.





Нашиль триглановой. *Pleuriscus trilobus*. Car.






2




1. Рыбка обыкновенная. *Gasterosteus pungitius*. L.
2. Рыбка колючая. *Gasterosteus aculeatus*. L.



Epus. acerina vulgaris. Cuvier.


32.




Oxyb.

Perca fluviatilis.


55.



Scomber scomber. Manpato.



34.



Gobius flavivittatus. Pall.






Вонанъ обыкновенный. *Cobitis sepulchris*. L.


2. May 1887. [illegible]






Карпъ обыкновенная. *Cyprinus Carpio L.*


37.



Carog. Cupea Harengus. L.




Trozkö. Atherina Hepsetus. L.




Salmo Trutta: L. Gopern.




40.



Евх. Belone. L. Осмородная Щука.





Pareuchanna glanis L.



12.



Trachiocephalus. Mugil Cephalus. L.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637



**THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL**



RARE BOOK COLLECTION

The André Savine Collection

SH633

.D85

1833

